

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 87kg
- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 전신 부종, 사지무력감을 호소하는 환자

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 183cm, 체중은 87kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량이 지속되고 있으며, 최근 스트레스, 찬바람, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통은 심하지 않으나 불편감을 호소하며, 전신 부종과 사지무력감이 동반된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일이다. 소화는 잘 안되는 편이며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 심하게 느끼지 않으나, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도로 약하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 정상이나 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.8°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 변비, 수족냉증, 다한, 피로감을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 특히 매운 음식을 섭취 후 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증과 다한 증상 또한 동반되며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.7°C

■ 요약

51세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 속쓰림, 복만, 복통을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 무거운 짐을 들거나 흡연 시, 기름진 음식을 섭취 시 악화된다고 한다. 수면 시에는 증상이 완화되는 경향을 보인다. 현재 이상지질혈증,

고혈압, 당뇨로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기, 코막힘, 코 가려움)은 호소하지 않는다. 요통은 경미한 수준(1/10)으로 나타난다. 소화불량 증상으로 수족냉증과 구역/구토를 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았다. 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회, 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 5번 발생한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀이 나고 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통이 있으며, 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명은 정상이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태이며, 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 56kg
- 활력징후: BP 125/78 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.7°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 주 증상임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 56kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 특히 야식 후 바로 눕는 경우 증상이 심해진다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 호소한다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/78 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 57kg
- 활력징후: BP 133/87 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.3°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 57kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만 및 복통 (2/5)이 있으며, 수족냉증과 구역/구토 증상을 동반한다. 수면 부족 및 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다. 특이 가족력은 없다.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않는다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/87 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 69kg
- 활력징후: BP 141/90 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.6°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 고혈압 및 심장병 가족력 있음. 잦은 음주, 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 69kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 불규칙한 식사 습관이 증상 발현의 주요 원인으로 판단된다. 환자는 복만, 복통(3/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취 등의

증상을 동반한다. 음주, 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

직업은 현장직이며, 매일 음주를 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑으며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/90 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.6℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 얇게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 66kg
- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.4°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 혈압약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 66kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 스트레스가 심한 업무 후 증상이 시작되었으며, 온찜질이나 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취 동반된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만, 복통, 구역감을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 65kg
- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.5°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있음. 변비, 혈뇨, 무한, 전신쇠약, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 65kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 특히 스트레스가 심한 업무 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취가 있으며, 식이조절 시 증상 완화를 경험한다. 기존에

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 고강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에서 땀이 나도 상쾌하지 않다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 82kg
- 활력징후: BP 101/61 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.3°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압 병력 있으며, 불규칙한 식사 후 증상 발현. 잦은 대변, 적색뇨, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 어지럼증, 흉조 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 82kg, BMI는 33.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 약 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취 등이 있다. 악화 요인으로는 흡연과 기름진 음식 섭취가 있으며, 수면과 휴식 시

증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 34일로 불규칙하며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 나타나며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10이다. (통증 양상은 없음)
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/61 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.3℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크며, 치흔설이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 74kg
- 활력징후: BP 105/77 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.2°C

■ 요약

83세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 습관과 수면 부족이 증상 악화 요인으로 작용. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 74kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사 습관과 수면 부족으로 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취가 있다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 특별한 완화

요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/77 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 호소하며, 정도는 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 73kg
- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 당뇨약 복용 중. 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 73kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 수개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피로 흡연력이 미미하다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회 소변을 보며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 다양하지 않다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 느끼며, 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크며, 치흔설이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 85kg
- 활력징후: BP 146/91 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.1°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소, 속쓰림, 변비, 잦은 소변, 다한, 피로감, 수족냉증, 창백한 안색을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 85kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림을 호소하였으며, 최근 증상이 심해져 내원하였다. 주관적인 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소하였다. 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/91 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이고 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 70kg
- 활력징후: BP 115/64 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발현, 수족냉증, 잦은 기침, 무한, 얇은 수면, 녹색변 등의 증상을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 167cm, 체중은 70kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 환자는 불규칙한 식사 후 증상이 발현되었으며, 무거운 짐을 들거나 찬바람을 쐬거나 기름진 음식을 섭취했을 때 증상이 악화된다고 호소한다. 수면 및

휴식 시에는 증상이 완화되는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취, 소화불량, 오심/구토 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕은 잠, 기상 시 피로감, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)
- 한열: 오한/추위탐, 수족냉증, 냉수 선호
- 땀: 無汗, 전신에 땀이 나며 땀 흘린 후 열감 호소
- 통증: 요통 강도 1/10, 통증 양상은 특별히 언급하지 않음
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕은 높음, 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/64 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 들, 사지 무력감 호소, 피부 건조 및 각질, 가려움 동반, 이명 강도 2/5, 난청 2/5, 어지러움 4/5
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 67kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.0°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증 및 당뇨를 가지고 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 67kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 악화되는 경향을 보인다. 매운 음식을 섭취한 후 증상이 발현되었으며, 온열 찜질 시 증상이 완화된다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역감,

부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비, 녹색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 64kg
- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.0°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 과거력 상 이상지질혈증과 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 64kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 시험/면접에 대한 스트레스로 인해 식욕부진이 발생하였으며,

복만, 복통과 함께 수족냉증, 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다. 과로, 흡연, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 적이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕부진, 소화불량, 구역, 구토 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 소변을 보며, 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.0°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 관찰되지 않고, 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔을 띈다.
- 설태: 백태가 박태로 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부긴실하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 68kg
- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 당뇨, 가족력으로 고혈압이 있다. 습한 환경, 수면 부족, 흡연 등이 악화 요인이며, 안정과 식이 조절 시 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 68kg, BMI는 26.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 불규칙한 식사 시 증상이 심해지며, 습한 환경, 수면 부족, 흡연 등이 악화 요인으로 작용한다. 안정 및 식이 조절 시 증상이 다소 완화된다고

한다. 주 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루에 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다. 어지러움이 심하다 (5/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 84kg
- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 106/분, 체온 38.4°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 회식 후 과음 및 과식 이후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 84kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 기름진 음식 섭취, 찬바람 노출, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일, 중강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 38.4°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 든다. 부종은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 78kg
- 활력징후: BP 114/69 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

57세 남성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 6개월 이상-1년 이내부터 증상 발현되었으며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 78kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주된 증상으로는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 수면부족, 과로,

장시간 앉기가 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 땀을 흘리는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/69 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 42kg
- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

13세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량으로 내원. 과거 고혈압 가족력, 습한 환경에서 악화, 식이조절 시 완화. 흑색변, 혈뇨, 잦은 소변, 얇은 수면, 수족냉증, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 어지럼 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 42kg, BMI는 16.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 식이조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통을 4/5

강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함을 호소, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통, 두부에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 71kg
- 활력징후: BP 118/75 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.9°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 발생한 소화불량 증상과 함께 피로감, 하지 부종, 이명, 어지럼 등을 호소한다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 71kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이며, 음주, 찬바람/냉기, 무거운 짐을 들 때 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 29일이며, 불규칙하다. 생리 기간은 5일이며, 생리통은 6/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 깊은 잠을 자지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/75 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.9°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 62kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.7°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 과거 기름진 음식 과식 후 증상 발현되었으며, 찬바람과 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 62kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 찬바람에 노출되거나 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다. 환자는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 생리통은 과거에 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5) 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 (3/5), 난청 (3/5)이 있으며, 어지러움을 (4/5) 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 58kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작, 변비, 야간 도한, 수족냉증, 무기력감을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 58kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 폐경 상태이며, 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경 이후 생리는 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 오심, 구토 증상이 있으며, 부패취 동반하는 트림, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5) 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 83kg
- 활력징후: BP 133/84 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.0°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되어 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 83kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었으며, 휴식 및 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 복만/복통은 4/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일이며, 불규칙하고, 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소하고, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 보통의 양이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/84 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고, 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 57kg
- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 57kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상으로 내원하였다. 환자는 복만 및 복통(4/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 특별한 악화 또는 완화 요인 없이 지속되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 71kg
- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.5°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량 및 수족냉증을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 71kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량 및 수족냉증을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상을 보인다. 무거운 짐을 들거나 과로 시 증상이 악화되며, 충분한 수면 후에는 증상이 완화된다고 한다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화 불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 74kg
- 활력징후: BP 135/82 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.1°C

■ 요약

42세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화됨. 변비, 수족냉증, 피로감을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 74kg, BMI는 33.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 간헐적으로 속쓰림, 복만, 복통을 느껴왔다. 증상은 장기간 진통제 복용 이후 더욱 심해졌으며,식이 조절 및 온찜질 시 일시적인 완화 효과가 있다. 최근에는 수족냉증, 구역감,

부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/82 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.1℃, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 72kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.1°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 시작. 변비, 수족냉증, 잦은 음주, 무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 72kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되는 경향을 보인다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 되지 않는다. 오심과 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 날 때가 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이며, 면색은 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 45kg
- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.2°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 악화. 기존 이상지질혈증, 당뇨 병력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 45kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 앉아있는 시간이 길어지면 증상이 악화되고,

수면을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 빈뇨(9회)가 있다. 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 잠들기 어렵고(입면장애 1/5), 자다가 자주 깬다(중도각성 True/5). 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.8°C

■ 요약

60세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작되었고, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약을 복용 중. 맥은 부, 세, 활맥을 띠고 설질은 담백하고 혀의 크기는 작으며, 설태는 백태와 박태가 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 186cm, 체중은 74kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 야식 후 발생한 속쓰림으로 시작되었으며, 이후

수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되었다. 증상은 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출될 때 악화되는 경향을 보이며, 식이 조절 및 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.8°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감이 있고, 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 91kg
- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.3°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 91kg, BMI는 36.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량, 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 스트레스와 습한 환경에서 악화되고 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

기존 질환으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (3/5), 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 호소
- 대변: 변비, 흑색변, 보통
- 소변: 맑은색, 주간 6회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며 기상 시 피곤함을 호소. 입면장애 (3/5), 중도각성 (2/5)
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않음. 수족냉증을 호소, 냉수 선호
- 땀: 전신에 땀이 거의 없고, 땀을 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 (3/10), 통증 양상은 다양하지 않음
- 정신/정서: 건망 증상, 무기력감 호소. 스트레스 대처 능력 낮음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종 관찰. 피부 건조도는 정상, 가려움증은 없음. 사지 무력감 호소, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 113/분, 체온 37.1°C

■ 요약

29세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원하였다. 과거 이상지질혈증 병력이 있고, 기름진 음식 과식 후 증상이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 70kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취 시 복만, 복통, 구역감, 신물 등의 증상이 나타난다. 수족냉증을 동반하며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일에 1번 정도 있으며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통이 있으며, 강도는 2/5 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 37.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 1/5 정도이다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태 및 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 59kg
- 활력징후: BP 105/60 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.9°C

■ 요약

59세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 59kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 시작되어 6개월 이상 지속되고 있으며, 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지며, 오심/구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며 따뜻한 음료를 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타난다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/60 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 53kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 기름진 음식 과식 후 증상 발현. 수면 부족 시 악화되며, 따뜻하게 하면 완화됨. 전신 부종, 사지 무력감, 잦은 대변, 오한, 무한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 53kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면 부족 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 비교적 긴 편이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌한 느낌은 없다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.8℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하며, 크기가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 65kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

45세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량과 5일 전부터 악화된 식욕부진을 호소하며 내원하였다. 평소 습한 환경에 민감하며, 온찜질과 안정을 통해 증상 완화를 경험한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 65kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 5일 전 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 5일 앞두고 심한 긴장을 느껴 식욕 부진을 경험하기 시작했다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 5일 동안 긴장으로 인해 식욕 부진이 심화되었다고 호소한다.

습한 환경에서 증상이 악화되며, 온찜질과 안정을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 대변은 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 보며, 소화불량과 관련된 복만, 복통, 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 동반한다. 수족냉증이 있으며, 피로감과 하지 부종을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중강도의 운동을 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심, 구토 증상 호소
- 대변: 하루 2-3회, 녹색, 묽음/연변
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐, 따뜻한 음료 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 다한, 야간/도한, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낌
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 보통, 기억력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감, 하지 부종, 멍이 쉽게 듦
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.4°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 당뇨병, 심장병 가족력, 흡연, 과로 등의 병력 및 생활 습관을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 58kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 1년 이내부터 속쓰림, 복만, 복통, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다. 수족냉증을 동반하며, 증상은 흡연 및 과로 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

당뇨병으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 소화불량, 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 형태이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 64kg
- 활력징후: BP 109/61 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.9°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 중요한 시험을 앞두고 긴장으로 인해 식욕 부진이 심화됨. 이상지질혈증 및 고혈압 과거력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 64kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 소화불량 증상이 지속되었으며, 최근 시험을 앞두고 스트레스가 심해지면서 증상이 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다. 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 진단받고 약물 치료 중이다. (이상지질혈증약 복용)

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심 증상 호소
- 대변: 1회/일, 녹색 변, 보통 굳기
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소에는 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 기억력 저하를 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/61 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.9°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 51kg
- 활력징후: BP 102/65 mmHg, 맥박 68/분, 체온 38.1°C

■ 요약

43세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 스트레스 심한 업무 후 증상 악화되었으며, 소화불량과 함께 변비, 다한, 수족냉증, 홍조 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 51kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량을 호소하며, 최근 2일간 극심한 스트레스 후 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 찬바람과 음주 시 증상이 악화되며,식이 조절 시 다소

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/65 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 38.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 어지럼증을 호소한다 (2/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

60세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압 및 당뇨 가족력이 있다. 최근 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 70kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화 중이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 낮에 9회, 밤에 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으며 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 59kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.1°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 59kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 69kg
- 활력징후: BP 113/65 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

39세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 수면 부족, 기름진 음식, 스트레스 등이 악화 요인으로 작용하며, 스트레칭과 식이 조절로 증상이 완화된다. 변비, 흑색변, 수족냉증, 다한, 무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 69kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 수면 부족, 기름진 음식

섭취, 스트레스 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭 및 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다. 동반 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕은 보통이나 소화가 잘 안 되며, 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 배변 횟수는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼나 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/65 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 부종은 없으며 멍들은 정상이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이며, 복합맥상으로 홍대맥이 나타난다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/70 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.8°C

■ 요약

42세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 79kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 음주 시 악화되고 수면 및 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 12시간 수면, 얇은 잠을 자며 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/70 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 68kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.2°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화됨. 변비, 흑색변, 수족냉증, 어지럼증, 이명, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 68kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 장기간 진통제 복용

후 속쓰림이 심해졌으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아 있는 자세, 과로, 습한 환경 등이 증상을 악화시키며, 스트레칭 및 식이 조절 시 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명(3/5), 난청(3/5)이 있다. 어지러움(5/5)을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 71kg
- 활력징후: BP 124/83 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.6°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증 및 당뇨가 있으며, 야식 후 속쓰림이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 71kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면 부족과 스트레스 시 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 동반 증상으로는 구역감, 신물,

부패취, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 발생하며, 중도각성은 5회 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/83 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.6℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움증을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부색하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 50kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.6°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 양상을 보임

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 50kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식을 섭취하거나 과로, 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 식이조절과 온찜질을 통해 증상 완화를 시도하고 있다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 무한증을 보인다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 쉽게 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 135cm / 35kg
- 활력징후: BP 105/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

10세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량, 수족냉증, 잦은 어지럼증을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여성 환자로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 35kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 스트레스에 의해 악화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 간접 흡연 경험은 없다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 잘 안되는 편이다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 몸이 차가운 편이며, 특히 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 140cm / 39kg
- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.8°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 수면 부족 및 냉기에 민감하며, 온찜질 시 완화됨. 무한, 야간 도한, 땀흘린 후 열감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 39kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환아는 1년 전부터 소화불량 증상이 있었으며, 최근 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되었다. 수면 부족 및 찬바람에 노출 시 증상이 심해지는 경향을 보이며, 온찜질 시 다소 완화된다고 한다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증,

구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 감기, 비염, 요통 관련 증상은 뚜렷하게 나타나지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 경험이 없다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 안된다고 호소함. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만, 복통이 강도 2/5로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 57kg
- 활력징후: BP 118/76 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.7°C

■ 요약

36세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 167cm, 체중은 57kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이며, 악화 요인으로 찬바람/냉기, 스트레스, 장시간 앉기가 있고, 완화 요인으로 휴식이 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량 증상이 있다. 오심/구토를 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(4/5), 중도각성(True/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/76 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 66kg
- 활력징후: BP 168/100 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.1°C

■ 요약

17세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원하였다. 야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었으며, 현재 증상은 악화 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 66kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 복만/복통, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 악화되는 경향을 보인다. 기름진 음식 섭취 및 과로 시 증상이 악화되고, 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다. 동반

증상으로는 수족냉증이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 평균 1.492669334325841개피를 피운다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/100 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 든다고 한다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다/태가 있다.
- 설태: 백태이며, 얇게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 80kg
- 활력징후: BP 178/108 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.2°C

■ 요약

55세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 및 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 동반하고, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 80kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취, 스트레스, 흡연 시 증상이 악화되며, 휴식 및식이 조절 시 증상이 완화된다. 환자는 복만/복통 (3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 소화기 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 현병력을 가지고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은/연변을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (True/5)을 보인다.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 무한(無汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망을 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 178/108 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 84kg
- 활력징후: BP 106/64 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.4°C

■ 요약

54세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 84kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 증상은 주로 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 자세, 스트레스 상황에서 악화되며, 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 완화된다. 환자는 속쓰림, 복부팽만감, 구역감, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다. 무한(無汗) 경향을 보인다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/64 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.4°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다(소).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 50kg
- 활력징후: BP 140/92 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.8°C

■ 요약

63세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 오한, 무한, 변비, 잦은 야간뇨, 피로감, 사지무력감, 이명, 저체온 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 50kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면부족, 기름진 음식 섭취, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고,식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 동반

증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/92 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 절로 멍이 잘 생긴다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 침긴맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 69kg
- 활력징후: BP 115/65 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.3°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕 부진을 느낌.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 69kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험 및 면접 준비로 인한 스트레스 증가로 증상이 악화되는 추세이다. 환자는 주로 복만감과 복통(2/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을

동반한다고 한다. 안정 및 식이 조절 시 증상 완화가 있는 편이다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심 증상 호소, 구토 증상 있음
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 3회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 보통, 열수를 선호하며, 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 무한(無汗), 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 기억력 저하를 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/65 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 61kg
- 활력징후: BP 114/75 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.5°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작됨. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 61kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 지속적으로 나타났으며, 증상은 호전되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 안정

시 증상이 완화되지만, 흡연 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/75 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 들고 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 백태와 니태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 71kg
- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 71kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스 과다로 증상 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다. 장시간 앉아있는 자세는 증상을 악화시키며, 식이조절과 안정을 취하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 장시간 앉아있는 생활 습관을 가지고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5이며, 난청은 없다. 어지러움은 1/5 정도이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 81kg
- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.3°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 사무직에 종사하며 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 최근 중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 식욕 부진이 심화되었으며, 녹색 변과 혈뇨, 잦은 소변, 수족냉증, 얇은 잠, 무기력, 이명, 어지러움 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 81kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상이 나타났으며, 최근 시험을 앞두고 긴장하면서 증상이 악화되었다고 한다. 주

증상으로는 복만, 복통, 구역, 신물, 부패취, 구고 등이 있으며, 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 증상이 다소 완화된다고 호소한다. 수족냉증을 동반하며, 설사 증세도 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중간 강도로 한다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심, 구토 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽은 변
- 소변: 잦은 소변 (주간 9회), 혈뇨
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질 저하, 기상 시 무거움, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소 보통, 수족냉증 호소, 따뜻한 음료 선호
- 땀: 땀이 거의 나지 않음, 두부에 땀이 나면 열감을 느낌
- 통증: 요통 (강도 1/10)
- 정신/정서: 기억력 저하, 무기력, 스트레스 대처 능력 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 들, 피로감 호소, 피부 건조도는 정상
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.2°C

■ 요약

55세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 식욕 부진, 묽은 변, 무력감, 수족냉증, 전신 부종, 기억력 감퇴 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 4일 앞두고 긴장하면서 식욕이 급격히 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 더욱 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만감, 복통, 묽은 변, 잦은 트림, 신물 오름, 구고 등이 있다. 따뜻하게 하면 증상이 다소 완화되는

경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며 소화가 잘 안 된다. 구역감이 있고, 부패취가 나는 트림을 한다. 신물이 올라오며, 입이 쓰다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 못 잔다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5) 정도이다. 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 많이 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘리는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.2℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5 정도이며, 난청은 없다. 어지럼증이 3/5 정도 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기가 크다 (대설).
- 설태: 백태가 끼어있고, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 78kg
- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.1°C

■ 요약

53세 남성, 1년 전부터 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 심화됨. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 수면 부족, 음주, 무거운 짐으로 인해 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 78kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통은 3/5 강도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 수면 부족, 음주, 무거운 짐을 들 때 악화되고 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 복만감과 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 대변이 굳은 편이다.
- 소변: 주간 9회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색깔은 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며 (0/5), 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나 (無汗), 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 설태가 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 56kg
- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.2°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 7일간의 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었다고 함. 묽은 변, 다한, 전신 부종, 사지 무력감 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 175cm, 체중은 56kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역감,

부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 장시간 앉아있거나 기름진 음식을 섭취할 때 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소하며, 구역감을 느낌.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊은 수면을 이루지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있으며, 빈도는 5회 중 True이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상을 보이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 80kg
- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스, 흡연, 수면부족, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 소화불량 증상 외 사지무력감, 묽은 변, 혈뇨, 무한, 열감, 건망, 무기력 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 169cm, 체중은 80kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 증상은 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등을 동반하며, 특히 스트레스가 심하거나 흡연, 수면 부족, 기름진 음식을 섭취할 경우 악화된다고

호소한다. 수족냉증을 동반하며, 대변은 묽은 편이고 혈뇨 증상도 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 느끼고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 미약하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 49kg
- 활력징후: BP 153/96 mmHg, 맥박 68/분, 체온 38.2°C

■ 요약

14세 남학생 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 복만, 복통, 신물, 구고 등의 소화기 증상과 함께 다한, 흑색변, 혈뇨, 하지부종, 전신 무력감, 피부 가려움, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반한다. 과로 시 증상 악화되며, 따뜻하게 하거나 휴식 시 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 49kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 야식 후 속쓰림으로 시작된 기능성 소화불량을 호소한다. 복만, 복통(4/5), 신물, 구고,

부패취 등의 증상이 있으며, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하거나 휴식 시 완화된다. 수족냉증을 동반하며 구역/구토 증상이 나타나기도 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/96 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 38.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청 정도는 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 130/83 mmHg, 맥박 92/분, 체온 38.3°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 시험/면접을 앞둔 긴장으로 식욕부진이 심화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 시험/면접에 대한 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 하루 1회 식사한다. 오심이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/83 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 38.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움이 3/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 64kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 119/분, 체온 37.9°C

■ 요약

43세 남성, 6개월 이상-1년 이내 속쓰림을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 64kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 속쓰림, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 확인되지 않았다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 37.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 없으며, 피부는 각질이 있고 건조하나 가렵지는 않다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 65kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.0°C

■ 요약

76세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상과 장기간 진통제 복용 후 속쓰림을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 65kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 습한 환경, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 안정 시에는 증상이 완화된다. 최근 4일간 속쓰림이 심해졌다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 장기간 진통제를 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.0°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 45kg
- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 45kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 심해지는 양상을 보인다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 기름진 음식을 섭취했을 때 증상이 악화되며,식이 조절 및 휴식을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 묽은 변 또는 연변을 하루 2-3회 본다. 대변 색은 황색이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 입면장애(2/5)와 중도각성(1/5)을 호소한다. 기상 시 개운함은 느껴진다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 특별히 언급하지 않았다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.8°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없으며, 멍들은 정상이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 100kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.8°C

■ 요약

52세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 100kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성소화불량을 호소한다. 증상은 주로 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 양상으로 나타난다. 악화 요인으로는 수면 부족과 찬바람/냉기에 노출되는 것이 있으며, 완화 요인으로는 충분한 수면과 스트레칭이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.6°C

■ 요약

33세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증 과거력 및 수면 부족, 음주가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취 후 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 수면 부족과 음주가 증상 악화 요인으로 작용한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 비교적 길지만, 깊은 수면을 취하며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이고, 피부는 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 세약맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 47kg
- 활력징후: BP 140/95 mmHg, 맥박 105/분, 체온 37.0°C

■ 요약

38세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압, 이상지질혈증 있으며, 최근 시험/면접을 앞두고 식욕부진 심화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 47kg, BMI는 13.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 7일 앞두고 심한 긴장으로 인해 식욕이 급격히 저하되기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 겪고 있으며, 최근 시험/면접 준비로 인해 증상이 더욱 악화되었다고 호소한다. 특히 습한 환경이나 찬바람에 노출될 경우, 무거운 짐을 들 때 증상이 심해지는 경향을 보이며, 안정을

취하거나 온찜질을 하면 일시적으로 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 약물 치료 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있고, 식적과 관련된 부패취, 간과 식적 관련된 신물, 열과 관련된 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 9회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 하루 평균 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 정도이며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/95 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 37.0℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 관찰되며, 피부는 각질이 있고 건조한 상태이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 70kg
- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.3°C

■ 요약

31세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 증상 악화. 흑색변, 혈뇨, 전신부종, 사지무력감, 이명, 난청, 오한, 무한, 피로감, 기억력 저하, 황색 면색 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 70kg, BMI는 20.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 스트레스가 심한 업무가 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 7일간 과도한 업무 스트레스 이후 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 습한 환경, 무거운 짐을 드는 행위, 흡연

등이 증상을 악화시키며, 따뜻하게 하면 증상이 완화된다고 한다. 감기, 비염 증상은 보이지 않는다. 요통은 경미한 수준(2/10)이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 2회
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.3℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌大
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 66kg
- 활력징후: BP 112/65 mmHg, 맥박 86/분, 체온 35.0°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 최근 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 오한, 다한, 수족냉증, 변비, 기억력 저하 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 66kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 특히 기름진 음식을 과식한 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등이 있다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/65 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 35.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 51kg
- 활력징후: BP 120/87 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.4°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원. 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하며 3일 전부터 식욕 부진을 호소함. 이상지질혈증 과거력 및 심장병 가족력 존재. 전신 부종, 사지 무력감, 어지러움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 180cm, 체중은 51kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 무거운 짐을 들거나 수면이

부족할 경우 증상이 악화되며, 식이 조절 시에는 증상이 다소 완화된다고 한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심 증상 호소, 구토 증상 있음
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5)
- 한열: 오한 경향, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (강도 1/10)
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력은 보통, 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/87 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 잘 드는 경향, 사지 무력감, 피부 건조도는 정상, 가려움증 호소, 어지러움 (5/5), 이명 (0/5), 난청 (1/5)
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 73kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.7°C

■ 요약

45세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨. 변비, 흑색변, 수족냉증, 잦은 트림, 신물 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 155cm, 체중은 73kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 6시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 주된 증상으로는 복만감과 복통(3/5)이 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 스트레칭이나

따뜻하게 찜질을 하면 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회, 야간에 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 전신에 흘리며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 60kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 112/분, 체온 36.8°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었고, 이상지질혈증, 심장병 및 중풍 가족력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 60kg, BMI는 18.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세임. 주 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 스트레칭 및 수면 시 증상 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량 지속, 오심 및 구토 증상 간헐적으로 나타남
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 2회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 호소. 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐, 열수를 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 보통 정도의 발한, 주로 두부에서 발생, 땀 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 강도 1/10, 양상은 다양하지 않음
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소. 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편, 피부 건조도는 정상
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 無力

- 맥상: 緩脈

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 62kg
- 활력징후: BP 170/103 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.9°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스 이후 증상 악화, 고강도 운동을 즐기는 학생

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 62kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 지속된 스트레스가 심한 업무 이후 소화불량 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 스트레스 상황에서 증상이 악화되는 경향을 보인다. 휴식과 수면 시 증상이 완화된다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 고강도 운동을 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5회 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/103 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.9°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 34kg
- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 남환, 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량으로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 흑색변, 잦은 배변, 수족냉증, 피로감을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 34kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세가 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만 및 복통을 호소하며, 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 경향이 있다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 및 난청은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 51kg
- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.6°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 51kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 불규칙한 식사 후 악화되었으며, 식이조절 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 환자는 복만/복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의

증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 25개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 얹게 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성이 있다. (True/5)
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.1°C

■ 요약

30세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 시험/면접 앞두고 긴장으로 식욕부진 시작. 잦은 녹색변, 얇은 수면, 수족냉증, 어지럼, 무기력, 잦은 야간 도한을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 시험 및 면접을 앞두고 심한 스트레스를 받은 이후 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만감과 복통을 경미하게 (1/5) 느끼며, 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물,

그리고 입 안의 쓴맛을 호소한다. 특별한 악화 요인은 없으며, 뚜렷한 완화 요인도 느끼지 못한다고 한다. 요통은 경미한 수준(1/10)으로 나타나며, 특별한 통증 양상은 나타나지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진이 있으며, 소화가 잘 안된다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 들지 못하며, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 (1/10) 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 의욕이 없다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증을 호소한다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 54kg
- 활력징후: BP 139/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.1°C

■ 요약

45세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 스트레스, 흡연, 수면 부족이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 54kg, BMI는 18.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만감과 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 미미하게 존재한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 멍이 잘 생긴다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명은 없으며, 어지러움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 백태, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/78 mmHg, 맥박 56/분, 체온 37.6°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작, 이상지질혈증 약물 복용 중. 잦은 음주와 흡연, 스트레스에 취약한 상태.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 70kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이며, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주와 15개피/일 흡연을 하며, 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량과 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/78 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 71kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.3°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 이상지질혈증 과거력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 71kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 시작되어 점차 악화되는 경과를 보였다. 주 증상으로는 복만감과 복통(3/5)이 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 음주, 흡연, 과로 시 증상이 악화되는

경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀이 보통 정도 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.3℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 70kg
- 활력징후: BP 164/103 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.5°C

■ 요약

66세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었으며, 고혈압 가족력, 흡연, 변비, 흑색변, 수족냉증, 무기력 등의 증상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 70kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 더욱 심해지는 경향을 보이며, 식이 조절 및 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다. 동반 증상으로 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고 변이 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나는 경우가 가끔 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 164/103 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 67kg
- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.7°C

■ 요약

60세 남성 환자로 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 발현되었으며, 이상지질혈증, 고혈압 병력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 67kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 나타나기 시작하였으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만감, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 25개피/일, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 3/5이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 피부는 건조하고 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)/태(苔)하다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 155/91 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.7°C

■ 요약

25세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 평소 스트레스와 기름진 식습관이 있으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중. 흑색변, 잦은 피로감, 하지 부종, 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 5시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

1년 전부터 속이 더부룩하고 불편한 증상이 지속되었으며, 최근 스트레스 증가와 함께 증상이 악화되었다. 찬바람에 노출 시 증상이 심해지는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 안 되고 속이 더부룩하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 특히 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/91 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다 (小).
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 69kg
- 활력징후: BP 130/82 mmHg, 맥박 74/분, 체온 38.1°C

■ 요약

73세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 69kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 음주와 스트레스에 의해 악화되고 스트레칭 및 온열에 의해 완화된다. 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 현병력이 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비, 녹색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 12회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/82 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 38.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.2°C

■ 요약

68세 여성 환자로 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 과식 후 속 불편함이 시작되었으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 5시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 속 불편함은 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상과 동반되어 나타난다. 장시간 앉아있거나 음주 시, 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며,

수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다(0개피/일). 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 의욕이 없는 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청 4/5이다. 어지러움 4/5
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 25세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 67kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.6°C

■ 요약

25세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거력으로 고혈압, 이상지질혈증이 있으며, 회식 후 과음과 과식 이후 증상이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 67kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 온찜질과 식이조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 높음.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 구역감과 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색 변을 보며 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.6°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 136cm / 42kg
- 활력징후: BP 122/84 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스, 장시간 앉기 등이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 42kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 악화 중이며, 스트레스 및 장시간 앉아있는 자세가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 식이 조절 및 안정을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

소화불량 증상으로는 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 보통으로 흘리며, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 스트레스 대처력은 좋다고 말한다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/84 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 79kg
- 활력징후: BP 155/93 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.1°C

■ 요약

29세 여성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증 병력, 가족력으로 당뇨를 가짐. 과로 및 수면부족 시 증상 악화되며, 오한, 수족냉증, 잦은 흑색 변, 다한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 79kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 과로 및 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/93 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 큼
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 133cm / 34kg
- 활력징후: BP 154/94 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작됨. 고혈압 가족력이 있으며, 오한, 수족냉증, 잦은 녹색변, 혈뇨, 창백한 면색, 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 133cm, 체중은 34kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 기억력이 나쁘며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/94 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 67kg
- 활력징후: BP 118/66 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.1°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스 심한 업무 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 67kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통은 경미한 수준(1/5)이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 치료 중 (혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약).

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경이 되었고, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 소화불량을 호소하며 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하지만, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/66 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 53kg
- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.3°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 53kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 기름진 음식이나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 올라옴, 입 안이 쓴 증상 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일이며, 불규칙한 편이고, 생리 기간은 0일, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 잠이 얕고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느낀다. 피부는 건조한 편이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 0/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 72kg
- 활력징후: BP 123/89 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화됨. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 72kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스가 심한 날에는 더욱 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 듯하다. 주 증상 외에 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감을 느낀다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 6회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘리면 피곤하고 냉해진다. 두부에 땀이 나는 경향이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/89 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 가려움증은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 어지러움(4/5)을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 77kg
- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 59/분, 체온 36.7°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압 및 심장병 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 77kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다고 한다. 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 설사, 변비 등의 배변 장애도

나타난다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮고, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 59회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 75kg
- 활력징후: BP 108/61 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.8°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 75kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 최근에는 속쓰림이 심해지고, 구역감과 신물 오름, 쓴 맛을 자주 느낀다고 한다. 수족냉증과 잦은 피로감을 동반한다.

【과거력】

당뇨로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동강도는 중에 해당한다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/61 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 60kg
- 활력징후: BP 113/66 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.4°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 과식 후 증상이 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 60kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량, 복만, 복통을 호소하며, 특히 기름진 음식을 섭취하거나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 휴식을 취하거나 온찜질을 하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 환자는 또한 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/66 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 100kg
- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.8°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 회식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로, 현장직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 100kg, BMI는 38.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 특히, 회식 후 과음 및 과식 시 증상이 더욱 심해진다고 한다. 동반 증상으로는 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움 등이 있다. 악화

요인으로 찬바람/냉기 노출이 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 몸에 열감은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 98kg
- 활력징후: BP 116/78 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.8°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 관련된 증상을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화, 고혈압 및 이상지질혈증의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 98kg, BMI는 35.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 증상은 불규칙한 식사 습관과 과로에 의해 악화되며,식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 현재 혈압약과

이상지질혈증약을 복용 중이다. 감기 증상 및 비염 증상은 호소하지 않으며, 요통은 경미(2/10)하게 나타난다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 약물 치료 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하지 않으며, 운동량은 저조하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증은 없다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통을 호소하며, 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/78 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.8°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움증이 있다. 이명(3/5)과 난청(4/5)이 경미하게 나타나며, 어지럼증은 1/5 정도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 37세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 60kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.6°C

■ 요약

37세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 흑색변, 다한, 오한 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 60kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 속쓰림, 구역감, 신물, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 휴식 및 식이 조절 시 완화되나, 음주 시 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증을 동반하며, 구고 증상도 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 무거운 느낌이 있다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 86kg
- 활력징후: BP 113/68 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.0°C

■ 요약

68세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 6개월 이상-1년 이내에 발병하였으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 86kg, BMI는 36.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 시작되었으며, 이후 증상이 점차 악화되는 양상이다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 기름진 음식 섭취 시

증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕은 보통이나 소화가 잘 안 되며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 10점 만점에 2점이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/68 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.0℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 5점 만점에 3점, 난청은 3점이다. 어지러움은 5점 만점에 3점이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 65kg
- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.1°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 65kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 복만, 복통이 심해졌다고 한다. 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 증상이 완화된다고 한다. 주소증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많고, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 4/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 83kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 87/분, 체온 38.2°C

■ 요약

49세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원하였다. 회식 후 과음, 과식 이후 증상 발현되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 83kg, BMI는 26.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 음주, 과로, 스트레스 시 악화되고 휴식이나 따뜻하게 하면 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역감을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 38.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 77kg
- 활력징후: BP 102/82 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.6°C

■ 요약

46세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 과거력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 77kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 환자는 주로 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물 오름, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 수면과 온난한 환경에서 완화되는

경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 불규칙하며, 생리통은 0/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 불량하다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 있으며, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/82 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 59kg
- 활력징후: BP 151/91 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.6°C

■ 요약

74세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 발생했으며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 59kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소하며, 복만 및 복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 찬바람/냉기 및 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일, 저강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/91 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 138cm / 38kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성 소화불량, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 악화. 흑색변, 잦은 소변, 야간 도한, 무기력, 어지럼증, 잦은 이명, 식사 불규칙, 냉수 선호.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 38kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다고 호소한다. 증상으로는 흑색변, 잦은 소변, 야간 도한, 무기력, 어지럼증, 잦은 이명 등이 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회로 빈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 5시간으로 수면 시간이 짧고, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 92kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

81세 여성 환자로 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력에 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 1년 이상 증상이 지속됨. 불규칙한 식사 후 증상 발생. 변비, 흑색변, 혈뇨, 전신부종, 사지무력감, 피부 가려움, 수족냉증, 얇은 수면, 도한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 92kg, BMI는 34.6이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 장시간 앉아있는

경우 증상이 악화되고, 휴식을 취하면 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간에 9회 소변을 보고, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 67kg
- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.8°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 섭취 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 67kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 스트레스, 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며 보통 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 69kg
- 활력징후: BP 122/88 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 활력징후는 BP 122/88 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 69kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 업무 스트레스가 심할 때 증상이 악화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/88 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이다. 복합맥상으로는 세약맥이 관찰된다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 49kg
- 활력징후: BP 118/79 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.1°C

■ 요약

23세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 회식 후 발생한 소화기 증상과 함께 수족냉증, 잦은 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 49kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세, 과로, 스트레스가 증상을 악화시키며,

스트레칭은 증상 완화에 다소 도움이 된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심, 구토 증상 동반.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 통증 강도 1/10으로 미미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/79 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으나, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 73kg
- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.7°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 과거력 상 고혈압 및 당뇨 가족력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 73kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 구역감, 신물 오름, 부패취, 구고 등이 있다. 특히 습한 환경, 스트레스, 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되는 경향을

보인다. 환자는 수족냉증을 동반하며, 사지 무력감을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5이다. 어지럼증은 경미한 수준(1/5)이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 39kg
- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.1°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되는 양상 보임. 고혈압 및 중풍 가족력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 39kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 및 휴식 시 증상 완화되며, 최근 증상 악화 추세이다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화 불량, 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 변비, 녹색 변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설, 태가 있다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 87kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.0°C

■ 요약

40세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생, 이상지질혈증 및 고혈압 병력, 흡연 습관, 습한 환경에서 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 87kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다. 특히 습한 환경과 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 다른 특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 다양하게 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 73kg
- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.2°C

■ 요약

31세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 수족냉증, 잦은 야간 도한, 창백한 안색 등이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 178cm, 체중은 73kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량 증상이 지속되고 있다. 증상은 주로 식후에 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 스트레칭과 온찜질 시 일시적인 완화를 보이나, 음주 시

증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 구체적인 통증 양상은 확인되지 않았다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 창백한 안색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 71kg
- 활력징후: BP 105/75 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.3°C

■ 요약

54세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 71kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 회식 후 발생하였으며, 휴식 및 온열 찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/75 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 63kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.9°C

■ 요약

52세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 63kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다. 증상은 수면 부족과 과로 시 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 병력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 5회 발생한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀이 나면 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 자주 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.1°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 발현. 스트레스, 음주, 기름진 음식에 의해 악화되며 안정 시 완화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 167cm, 체중은 62kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며 스트레스, 음주, 기름진 음식 섭취 시 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물,

구고 등이 있다. 현재 증상은 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 60kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 50/분, 체온 36.1°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 60kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 불규칙한 식사 후 악화되는 경향을 보이며, 온찜질 및 스트레칭 시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 9회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 없고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청 2/5, 어지러움 3/5.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 147/96 mmHg, 맥박 117/분, 체온 37.1°C

■ 요약

45세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량, 복만/복통, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 복만 및 복통이 3/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 증상은 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 낮다. 주로 장시간 앉아서 근무하며, 무거운 짐을 드는 경우가 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 4회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회이다.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/96 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지럼증은 0/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 58kg
- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

14세 남학생 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 58kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 기름진 음식을 섭취 시 복만, 복통, 구역감 등의 증상이 심화된다. 온찜질이나 휴식을 취하면 증상이 다소 완화되나, 장시간 앉아 있을 경우 증상이 악화된다. 수족냉증, 잦은 명, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지러움, 사지 무력감 등의 증상도 동반한다. 구고, 신물,

부패취 등의 증상도 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점 중 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 10점 만점 중 2점이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 66kg
- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.4°C

■ 요약

50세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 변비, 잦은 소변, 야간 발한, 이명, 어지러움, 사지무력감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 66kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기(冷氣) 노출과 수면 부족(睡眠不足)을 언급하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 35개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고를 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 야간에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간/도한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특이적인 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 195cm / 67kg
- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.3°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 무거운 짐을 들거나 수면 부족 시 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 195cm, 체중은 67kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 환자는 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다고 진술하였다. 무거운 짐을 들거나 수면 부족 시

증상이 악화되며, 스트레칭이나 온찜질 시 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 저 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 낮에 12회, 밤에 2회 소변을 보며, 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도로 경미하다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 82kg
- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.4°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 82kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되었다. 주 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용하고 있다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘리지 않으나, 두부에 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이며, 어지럼증은 1/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 76kg
- 활력징후: BP 143/97 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.3°C

■ 요약

56세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 주된 발병 에피소드이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 76kg, BMI는 29.7이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량으로 1년 이상 증상이 지속되었으며 호전 중이다. 이상지질혈증 및 고혈압을 동반하고 있으며, 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/97 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 135cm / 35kg
- 활력징후: BP 146/94 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.0°C

■ 요약

11세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화, 수족냉증, 야간 도한, 변비, 무력감, 황색 면색, 침맥, 황태 등의 소견을 보임

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남 환자로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 35kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 주소로 내원하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다고 한다. 악화 요인으로는 음주와 찬바람/냉기가 있으며, 완화 요인으로는 안정과 스트레칭이 있다. 소화불량 증상으로는 복만/복통

(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 감기 증상은 없고, 비염 증상도 없다. 요통은 강도 4/10이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/94 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 박태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 84kg
- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.7°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상과 수족냉증, 잦은 묽은 변, 다한 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 84kg, BMI는 35.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량 증상을 호소하며, 주요 증상으로는 복만감, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 주로 기름진 음식을 섭취했을 때 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제를 복용하였다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.7°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 3/5 강도로 나타난다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 74kg
- 활력징후: BP 157/94 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음과 과식 이후 증상 시작. 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 173cm, 체중은 74kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식, 음주, 스트레스에 의해 악화되고 수면으로 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증,

구역, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 뭉거나 연한 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 3회로 잤은 편이다.
- 수면: 5시간으로 부족하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/94 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 80세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 67kg
- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.3°C

■ 요약

80세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거 고혈압 가족력, 잦은 음주 습관이 있으며, 변비, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 어지러움 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 67kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 휴식 및 수면 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고, 보통 굳기이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.3°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 46kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.3°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 46kg, BMI는 18.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 이후 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 과로할 때, 찬바람에 노출될 때 악화되며 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 5개피의 흡연력이 있다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 황색뇨이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 81kg
- 활력징후: BP 156/90 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.3°C

■ 요약

33세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 81kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 복만, 복통, 구역, 신물 등의 증상이 악화되었다. 찬바람과 수면 부족 시 증상이 악화되며, 안정 시에는 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동은 저강도로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 불량, 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한이 있으며, 전신에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/90 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 면색은 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 71kg
- 활력징후: BP 104/76 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.4°C

■ 요약

47세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 71kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 찬바람/냉기, 과로, 습한 환경에 의해 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고

등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 가지고 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량 증상이 있음. 구역/구토 증상 호소.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 뭉거나 연한 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성은 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/76 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 33kg
- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

11세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화됨. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 33kg, BMI는 15.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 이후 속쓰림이 더욱 심해졌다고 한다. 주 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 음주 및 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 진통제 장기 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도 각성은 5회 중 True이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 73kg
- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

46세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 스트레스 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 73kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 있었으며, 최근 시험 및 면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 온찜질 시 증상 완화된다고 한다. 감기 증상 (발열,

오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심 및 구토 증상 있음.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 3/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태이고 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 77kg
- 활력징후: BP 119/70 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.2°C

■ 요약

75세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 77kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기, 수면 부족, 습한 환경이 있으며, 완화 요인으로는 수면이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화불량을 호소하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽거나 연변이다.
- 소변: 맑은 색이며 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간 수면, 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 나는 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/70 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.7°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었으며, 습한 환경과 과로 시 증상이 심해짐. 변비, 수족냉증, 잦은 소변, 피로감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경과 과로 시 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 온수를 선호하며, 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이며, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상 면색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 니태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 59kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.0°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 과로 시 증상 악화, 수면 시 완화되는 경향을 보임. 잦은 소화불량과 더불어 수족냉증, 어지럼증, 땀흘린 후 열감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 59kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 지속적으로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 주로 복만감, 복통,

구역감, 신물 오름, 잦은 트림, 구고 등을 동반한다. 과로 시 증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 최근 어지럼증을 심하게 느껴 일상생활에 불편함을 느끼고 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 호소한다. 수족냉증 또한 동반되어 불편함을 가중시킨다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 25개피/일, 운동강도는 낮은 편이다. 생리주기는 35일로 불규칙하며, 생리 기간은 7일, 생리통은 1/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심 및 구토 증상이 나타날 때가 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있고, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.0°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.

- 설태: 황태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 25세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 97kg
- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.6°C

■ 요약

25세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량 및 동반 증상(수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 97kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리고, 특히 두부에 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 두부에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5로 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 61kg
- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.9°C

■ 요약

70세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스와 관련된 소화불량, 수족냉증, 구역감, 신물, 구고 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 61kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 스트레스, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 증상이 악화되고, 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다. 기상 시 피로감을 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 62kg
- 활력징후: BP 173/102 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.4°C

■ 요약

46세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 및 수면부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 62kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 과로 및 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 규칙적이며, 구역 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/102 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.4°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 피부는 각질이 있으며 건조하다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기가 작다.
- 설태: 황색 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 73kg
- 활력징후: BP 103/67 mmHg, 맥박 114/분, 체온 36.7°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 특히 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 심화되는 양상을 보임. 이상지질혈증 약물 복용 중이며, 수족냉증, 전신 부종, 잦은 피로감, 변비, 얇은 수면 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 174cm, 체중은 73kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량을 호소하며, 특히 매운 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는

복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등이 있으며, 수족냉증을 동반한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 3회/일 섭취한다. 소화불량으로 불편감을 호소하며, 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/67 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 36.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태이고 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 65kg
- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.0°C

■ 요약

56세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 악화 중. 최근 중요한 시험/면접 앞두고 식욕 부진, 복만, 구역, 신물 등의 증상 호소. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 65kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 찬바람/냉기, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며 스트레칭

시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (True/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있고, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 74kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.2°C

■ 요약

24세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작, 이상지질혈증 병력 있음

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 74kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 회식 후 과음, 과식 시 증상이 심화된다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 무거운 짐을 들 때 증상이

악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조한 편이며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부건실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 85kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.1°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 사무직에 종사하며, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 기름진 음식 과식 후 증상이 악화되었으며, 고혈압 및 당뇨 현병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 85kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화된다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이

있다. 과로 시 증상 악화를 호소한다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 현병력이 있으며, 혈압약 및 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며 온수를 선호한다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 답변하였다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다(대).
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 118/72 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 시작됨. 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 찬바람, 음주, 장시간 앉는 자세에 의해 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 전 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 이후 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있다. 찬바람/냉기(冷氣), 음주(飲酒), 장시간 앉기(久坐) 등의 요인에 의해 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 더위를 타지 않으며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/72 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5. 어지러움 5/5.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 77kg
- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 119/분, 체온 37.0°C

■ 요약

43세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량, 4일 전부터 시험/면접으로 인한 식욕부진 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 77kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 최근 시험/면접에 대한 스트레스로 인해 증상이 악화되었으며, 따뜻하게 하거나 식이조절을 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심/구토 있음
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 1회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호함
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 강도 3/10
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 저하

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 37.0°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 절로 멍이 생김, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움증 호소
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 56kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 113/분, 체온 37.8°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량, 변비, 혈뇨, 잦은 소변, 다한, 수면 문제, 사지무력감, 피부 건조, 이명, 난청을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 56kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 속쓰림 외에도 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (3/5), 소화불량 호소. 구역감 있음.
- 대변: 변비, 황갈색, 굳은 변.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 3회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5).
- 한열: 열감, 더위탐, 온수 선호, 수족냉증 있음.
- 땀: 두부 다한, 땀 흘린 후 피로감 및 냉감 호소.
- 통증: 요통 강도 3/10
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕 저하. 스트레스 대처 능력은 보통.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종, 멍이 쉽게 들, 사지무력감 호소, 피부 건조 및 가려움증.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 59kg
- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 시험/면접을 앞두고 긴장하며 6일 전부터 식욕 부진 시작. 변비, 흑색변, 수족냉증, 무력감, 이명, 난청, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 59kg, BMI는 21.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6일 전부터 식욕부진이 시작되었으며, 이후 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 무거운 짐을 들거나 흡연 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 평소 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보이며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 심하고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5이며, 어지러움이 3/5 정도이다.
- 면색: 창백한 안색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 73kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.9°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 73kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 중이며, 기름진 음식 섭취 시 악화되고 휴식 시 완화된다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 2회 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 얕으며, 기상 시 개운함을 느끼지 못한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태이며, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 89kg
- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 107/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨병의 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 89kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 불규칙한 식사 및 스트레스에 의해 악화되고, 안정을 취할 시 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다. 복용 약물은 당뇨약과 이상지질혈증약이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중등도로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 다소 저하되었으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 37.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청 1/5, 어지러움 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 48kg
- 활력징후: BP 109/69 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

85세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 시험/면접을 앞두고 긴장하며 식욕부진이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 48kg, BMI는 17.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 5일 전 시험/면접을 앞두고 긴장한 이후 식욕부진이 심화되었으며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 자세와 음주 시

증상이 악화되며, 식이조절과 휴식을 통해 일부 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 0회, 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 열감과 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/69 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 110/73 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.8°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 폐경 상태임. 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 기름진 음식 섭취, 과로, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다. 땀을 흘리지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/73 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 52kg
- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.5°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 흑색변, 수족냉증, 전신 부종, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 52kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림을 호소하며, 이후 증상이 점차 악화되었다. 특히 습한 환경과 장시간 앉아있는 자세, 흡연 등이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다고 한다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을

동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 0.0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애 (1/5) 및 중도각성 (True/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스에 대한 대처 능력이 낮은 편이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태 및 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 45kg
- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.2°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 45kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 찬바람/냉기에 노출 시 증상이 악화된다고 한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 47kg
- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.7°C

■ 요약

12세 남학생, 시험을 앞두고 긴장하며 3일 전부터 식욕부진과 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 47kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3일 전부터 시험에 대한 긴장으로 인해 식욕 부진을 보였으며, 이후 소화불량 증상이 나타났다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 기름진 음식을 섭취하거나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되는 경향을 보이며, 수면이나 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심, 구토 증상 호소
- 대변: 흑색변을 2-3회/일, 보통 정도의 굳기로 배변
- 소변: 황색뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없음
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애 1/5, 중도각성 True/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 사지무력감은 없다. 피부는 건조한 편이며 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 49kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.2°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험/면접 스트레스로 증상 악화됨. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상과 변비, 다한, 어지러움, 얇은 수면, 하지부종 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 49kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 특히 습한 환경에서 증상이 악화되며, 온찜질 시 일시적인 완화 효과가 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 해당 질환에 대한 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 식욕 부진을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 길지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5)와 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 어지러움을 호소하며 (5/5), 이명 (0/5)과 난청 (0/5)은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 53kg
- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거 기름진 음식 과식 후 속 불편함을 느낌. 고혈압 가족력, 잦은 식사, 묽은 변, 다한, 무력감, 창백한 면색, 홍설, 백니태, 활맥, 세약맥 등을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 53kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 한다. 온찜질과 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 환자는 수족냉증(虛), 구역/구토(濕熱), 부패취(食積), 신물(肝/食),

구고(熱) 등의 소화기 관련 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 32일이며, 불규칙하고, 생리 기간은 0일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 규칙적이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고, 멍이 잘 든다. 어지러움은 거의 없다 (0/5). 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 크기는 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 45kg
- 활력징후: BP 115/69 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

57세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 45kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 속쓰림, 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위, 음주가 있으며, 스트레칭과 휴식을 통해 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 전신에 땀이 나지 않는다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/69 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고, 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/62 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.0°C

■ 요약

69세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 68kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량으로, 최근 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 안정 및 스트레칭 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으나, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높으나 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/62 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색의膩苔가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥, 虛大

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

15세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었음. 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 무거운 짐을 들 때 악화되고 스트레칭이나 따뜻하게 하면 완화된다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (2/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 12시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감 호소, 입면장애(4/5), 중도각성(3/5)
- 한열: 보통, 수족냉증, 냉수 선호
- 땀: 다한, 전신 발한, 발한 후 피로감 및 냉감 호소
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망, 스트레스 대처 능력 보통, 의욕 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 사지 무력감 호소, 피부 건조도는 정상, 가려움 없음, 이명 강도 1/5, 난청 1/5, 어지러움 3/5
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 70kg
- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.2°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상 및 고혈압, 이상지질혈증을 동반하며, 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 70kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상이 시작되었으며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을

보인다. 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)은 호소하지 않는다. 요통은 강도 4/10으로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일, 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증은 없다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.2°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 51kg
- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.1°C

■ 요약

13세 남학생으로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압 가족력이 있다. 흡연, 수면 부족, 과로 시 증상 악화, 수면 시 완화되는 경향을 보임. 저체온, 소화불량, 요통, 이명, 난청, 어지러움 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 51kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 야식 후 발생한 속쓰림이 지속적으로 나타나며, 증상의 호전과 악화가 반복되는 양상을 보인다. 흡연, 수면

부족, 과로 시 증상이 악화되고, 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없고 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움을 5/5로 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 켜다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 76kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.4°C

■ 요약

18세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되었고, 과로 시 악화, 수면 및 안정 시 완화됨. 변비, 잦은 피로감, 더위 탐, 수족냉증 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 76kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 지속적으로 나타났다 호전되기를 반복한다. 최근 진통제 복용 이후 속쓰림이 심해졌으며, 과로 시 증상이 악화되고 수면 및 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는

수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 면색은 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 85kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.4°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 가족력으로는 당뇨가 있다. 최근 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 악화되었고, 수족냉증, 흑색변, 잦은 소변 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 85kg, BMI는 38.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 더욱 악화되었다고 한다.

주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 환자는 특히 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아 있을 때 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 1/10 강도로 나타나며, 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 무기력감을 호소한다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 66kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.9°C

■ 요약

42세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압, 당뇨병력이 있고, 흑색변, 수족냉증, 잦은 트림 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 174cm, 체중은 66kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 야식 후 속쓰림이 발생했으며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림을 반복한다. 음주 시 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통(4/5), 수족냉증,

구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨의 현병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이며 어지러움이 약간 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 47kg
- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화. 평소 기름진 음식, 과로, 무거운 짐 등으로 증상 악화되며, 스트레칭과 온찜질로 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 47kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 평소 복만, 복통을 느끼며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 과로, 무거운 짐을

들 때 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 찜질을 하면 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 불량하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 55kg
- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.0°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식습관과 이상지질혈증 과거력 있음. 수족냉증, 무한, 변비, 피로감, 기억력 저하 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 55kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 오르내림이 있으며, 주로 식사 후 복만감, 복통, 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 특히 수족냉증이 심하며, 휴식을 취하면 다소 완화되나, 장시간 앉아 있을 경우 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이거나, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토, 신물, 구고, 부패취 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며(無汗), 야간에 식은땀을 흘리는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있으며, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 82kg
- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.2°C

■ 요약

52세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 82kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (3/5)을 동반한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 수면 부족 및 찬바람에 노출 시 악화되며, 수면 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.2°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 최근 중요한 시험을 앞두고 식욕 부진 및 수면 부족을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 70kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕 부진이 심화되었고, 구역감, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 수면 부족과 습한 환경에 노출 시

증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증을 동반하며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 간헐적으로 호소한다. 부패취가 나는 트림을 자주 하며, 신물이 올라오는 증상 또한 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. (0개피/일) 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 된다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성은 있다 (True/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 75kg
- 활력징후: BP 140/96 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.7°C

■ 요약

23세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 고혈압 및 이상지질혈증을 동반하고 있음. 회식 후 증상 발현되었으며, 피로감과 전신 부종을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 75kg, BMI는 30.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

1년 전 회식 후 소화불량 증상 발생하여 지속 중이며, 최근 피로감과 전신 부종이 심화되었다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 고혈압 및 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량 증상 지속, 구역감 호소
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 3회
- 수면: 수면시간 3시간, 수면의 질 저하, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낌
- 통증: 요통 강도 2/10, 다양한 소화불량 관련 통증 호소
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕 저하, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/96 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 잘 들고, 피부 건조 및 가려움 호소, 사지 무력감 호소, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 52kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.4°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화됨. 평소 수족냉증과 잦은 피로감을 느낌.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 52kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량을 호소하며, 복만, 복통 (3/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 장기간 진통제 복용 이후 악화되었으며, 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 잦은 빈뇨 (주간 12회, 야간 1회), 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 얕은 잠을 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 59kg
- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 113/분, 체온 38.3°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 회식 후 과음과 과식으로 인해 증상이 시작됨. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 59kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 저체온을 보이며, 잦은 기침을 호소한다. 비염 증상은 호소하지 않는다. 요통은 경미하며, 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 회식 후 과음, 과식 후 발생했으며, 호전되는 경과를 보인다. 수면과 안정을 취할 때 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 38.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.8°C

■ 요약

53세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕 부진과 수면 부족을 겪고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험/면접에 대한 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 수면 부족이 증상 악화에 영향을

미치는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 58kg
- 활력징후: BP 90/75 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.6°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 58kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 6시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 간헐적으로 겪어왔으며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되었다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 대변을 보통 굳기로 배변한다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 90/75 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 4/5 정도로 느낀다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.2°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작, 잦은 배변, 혈뇨, 무력감, 피부 가려움, 이명, 홍조 등의 증상을 보임

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 야간보다 주간에 소변 횟수가 잦으며 혈뇨를 동반한다. 전신 무력감과 피부

가려움, 심한 이명 또한 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 (4회/일), 소화불량, 오심 호소
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 적색/혈뇨
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증은 없음
- 땀: 무한 (無汗), 전신 발한 후 열감
- 통증: 요통 (2/10), 특징적인 양상은 없음
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력 낮음, 기억력 양호, 무기력감 호소

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 드는 체질, 피부 건조도는 정상, 가려움 호소
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 145cm / 48kg
- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.5°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 증상 악화를 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 145cm, 체중은 48kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상이 지속적으로 악화되어 내원하였다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세는 증상을 악화시키며, 온찜질은 증상을 완화시킨다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다. 생리주기는 28일이며, 불규칙성은 확인되지 않았다. 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 5점 만점에 5점이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 76kg
- 활력징후: BP 117/79 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.2°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량과 복부 불편감을 호소하며 내원함. 특히 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 184cm, 체중은 76kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 매운 음식을 섭취 후 발생한 복부 불편감 및 소화불량이 지속되고 있다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 최근에는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고 있다. 증상은 매운 음식을 섭취하거나

스트레스를 받을 때 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않는 무한(無汗)이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/79 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 76kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.2°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스, 흡연, 장시간 앉기가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 76kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 7일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 지속적으로 나타나고 있다. 스트레스, 흡연, 장시간 앉기가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 뚜렷한 완화 요인은 없다. 복만/복통(2/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역/구토,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심 및 구토 증상 호소.
- 대변: 변비, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 절로 멍이 드는 증상이 나타난다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 84kg
- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.6°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 84kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상 악화 추세이다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 악화 요인으로는 과로, 무거운 짐을 드는 행위, 습한 환경 등이 있다. 발열은 없으나 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 3/5 정도로 느낀다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 64세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 76kg
- 활력징후: BP 130/86 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 야식 후 속쓰림이 주 증상이며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 76kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 속쓰림, 복만, 복통, 신물 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 야식 후 악화되며, 식이 조절 시 다소 완화되는 경향을 보인다. 장시간 앉아있는 자세, 습한 환경, 수면 부족 등이 증상 악화에

영향을 미치는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 구토, 신물, 구고, 부패취 등을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/86 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/64 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 발생하였으며, 이상지질혈증을 앓고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 58kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 스트레스와 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 휴식 및 온찜질로 완화된다. 이상지질혈증을 앓고 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 1일 3회이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 감각을 느끼나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/64 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감이 있으며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자색이며, 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.0°C

■ 요약

49세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 과거력 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 불규칙한 식사가 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 통증 강도는 2/5 정도이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 과거력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얕고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 전신에 땀이 없으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.0°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미한 정도(1/5)이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 73kg
- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.0°C

■ 요약

53세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 73kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다고 한다. 환자는 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주 증상 외에 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연력은 25개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감/더위탐 경향이 있으며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 68kg
- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.3°C

■ 요약

69세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 68kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량 증상을 호소하며, 최근 속쓰림이 심해짐. 복만, 복통은 경미(1/5)하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일, 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량, 오심이 있음.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 잠, 기상 시 무거움, 입면장애(2/5), 중도각성(1/5).
- 한열: 보통, 온수를 선호, 수족냉증은 없음.
- 땀: 보통, 두부에 땀이 나며, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통은 강도 1/10.
- 정신/정서: 기억력 저하, 무기력, 스트레스 대처 능력 낮음.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.3°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 하지 부종 관찰, 피부 건조도는 정상이나 가려움 호소, 이명 강도 2/5, 난청 3/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.0°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증을 앓고 있음. 평소 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 장시간 앉아있는 경우와 수면이 부족할 때 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 현재 이상지질혈증으로

약물 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 주로 앉아서 근무하는 사무직에 종사한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 9회 정도 주간에 보고, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 5번 중 자주 있는 편이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 가끔 두부에 땀이 나지만, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소하나, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 멍이 잘 드는 편이며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 크고 부어있다.
- 설태: 황태와 니태가 끼어있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 50kg
- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.2°C

■ 요약

14세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 변비, 흑색변, 다한, 오한, 피로감, 소화불량 등의 증상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 50kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 식이조절 시 증상 완화가 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 확인되지 않았다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관, 복만/복통 (3/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 보통의 양상을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며, 어지러움을 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 80kg
- 활력징후: BP 119/69 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.7°C

■ 요약

71세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 최근 중요한 시험을 앞두고 긴장하며 식욕 부진을 겪음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 80kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일 전 중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 오르내리는 경과를 보인다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 식이 조절을 통해 증상이 완화된다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 치료 중이다. 복용 중인 약물은 당뇨약과 이상지질혈증약이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증은 없고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 저하되어 있고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/69 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.9°C

■ 요약

17세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림으로 발병. 스트레스, 흡연, 습한 환경에 악화되고 안정 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 스트레스, 흡연, 습한 환경에 노출될 때 악화되며, 안정을 취할 때 완화되는 경향을 보인다. 최근 증상이 호전되는 추세이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으나 흡연은 0.0개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 구역감과 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 잠들지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 다소 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/68 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.1°C

■ 요약

22세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 악화됨. 흑색변, 전신 부종, 수족냉증, 황색면색, 침세완맥 등의 소견을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 66kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후로 소화불량 증상이 지속적으로 나타나고 있으며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통은 경미(1/5)하게

나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애(5/5) 및 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/68 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 황태 및 박태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 51kg
- 활력징후: BP 106/76 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.5°C

■ 요약

54세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었으며, 변비, 식욕부진, 구역감, 신물, 쓴맛 등의 소화기 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 51kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 불규칙한 식사 후 복만감, 구역감, 신물 등의 증상이 심해지는 양상을 보인다. 환자는 식욕부진을 느끼며, 변비 증상도 동반하고 있다. 특별한 악화

또는 완화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심, 구고, 신물, 부패취 있음
- 대변: 변비, 녹색, 굳음/경변
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증 없음
- 땀: 무한, 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낌
- 통증: 요통 (통증 강도 1/10)
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 낮음, 기억력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/76 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 드는 경향이 있음, 피부는 건조하고 각질이 있음, 이명 강도 5/5, 난청 1/5, 어지러움 0/5
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 얇음
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 79kg
- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.8°C

■ 요약

43세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 회식 후 증상 시작. 고혈압 가족력. 흑색변, 잦은 야간뇨, 다한, 무기력, 전신 부종, 이명, 난청, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로, 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 79kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 호전 중이나, 찬바람, 흡연, 음주 시 악화되며, 따뜻하게 하거나 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통(4/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다. 또한, 잦은 흑색변, 다한, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 난청 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 맑은색, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 무거움을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 81kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.2°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 과로와 냉기에 의해 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 81kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 과로와 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압과 중풍 이력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 형태를 보인다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.0°C

■ 요약

73세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 사지 무력감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 구역, 신물, 부패취, 구고 등이 있으며, 수족냉증을 동반한다. 온찜질 시 증상 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘리면 피곤하고 냉하다고 한다. 두부에서 땀이 나는 경향이 있다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 세약하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 69kg
- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.6°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 매운 음식을 섭취 후 복부 불편감이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 163cm, 체중은 69kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며, 찬바람/냉기(冷氣)에 노출될 경우 악화되고 스트레칭을 통해 완화된다고 한다. 복만/복통(4/5), 수족냉증(Cold Limbs) -

虛, 구역/구토(Nausea) - 濕熱, 부패취(Foul Belching) - 食積, 신물(Acid Reflux) - 肝/食, 구고(Bitter Taste) - 熱 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 길지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 열감/더위를 타며 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.6℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 확인된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 85kg
- 활력징후: BP 90/60 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.1°C

■ 요약

75세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 흑색변, 오한, 하지부종, 사지무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 85kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 속쓰림, 복만, 복통이 지속되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 안정하거나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고, 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 90/60 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.1°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명은 없으며 (0/5), 난청은 경미하다 (2/5). 어지럼증은 없다 (0/5).
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다 (小).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 73kg
- 활력징후: BP 144/98 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.0°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과음, 과식 후 증상 시작. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 활맥, 홍설, 황니태 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 73kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 간헐적인 복만, 복통(3/5)을 동반한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타나며, 온찜질과 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 특히 악화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 과거 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 15개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 대변의 형태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 3회의 빈뇨를 호소한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/98 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 수준이다. 어지럼증은 호소하지 않는다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 58kg
- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.6°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 발생했으며, 습한 환경, 음주, 수면 부족 시 악화되고 안정과 휴식 시 완화된다. 수족냉증을 호소하며, 설진상 홍설, 황니태, 맥진상 부맥, 홍맥, 활맥이 확인된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 58kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 증상은 비슷하게 유지되거나

오르내림이 있으며, 습한 환경, 음주, 수면 부족 시 악화되고 안정 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 소화불량 증상으로는 복만/복통 (3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10으로 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 134cm / 33kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.0°C

■ 요약

10세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 야식 후 속쓰림으로 시작됨. 평소 기름진 음식 섭취와 과로가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 수족냉증, 잦은 녹색변, 옅은 수면, 무력감, 피부건조 및 가려움, 창백한 안색 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여 환자로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 33kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환아는 6개월 전부터 간헐적인 속쓰림을 호소하였으며, 최근 증상이 악화되어 내원하였다. 환아는 식사 후 복부

팽만감과 함께 구역, 신물 오름, 잦은 트림을 호소한다. 특히 기름진 음식을 섭취하거나 과로를 한 경우 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 아울러 수족냉증, 잦은 녹색변, 열은 수면, 무력감, 피부건조 및 가려움, 창백한 안색 등을 동반하고 있다. 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)은 호소하지 않았다. 요통은 경미하게 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환아는 학생으로, 음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (4/5), 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 오한, 추위를 탐, 열수를 선호, 수족냉증 호소
- 땀: 보통, 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피로감 및 냉함을 느낌
- 통증: 요통 (4/10), 통증 양상은 다양하지 않음
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감, 안면 부종, 멍이 잘 드는 편, 피부 건조 및 가려움 호소
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 88kg
- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.6°C

■ 요약

36세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다. 당뇨 및 이상지질혈증 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 88kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 특히 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다고 한다. 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화는 불량하다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나빠고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태 및 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 153/93 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.2°C

■ 요약

17세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 신물, 구역감, 복부팽만감 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 야식 후 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없는 것으로 보인다. 최근 증상이 다소 호전되는 중이라고 진술하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일로 불규칙하며, 생리 기간은 7일이다. 생리통은 2/10 정도로 경미하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/93 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 52kg
- 활력징후: BP 163/106 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.2°C

■ 요약

13세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 52kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출될 경우 악화된다. 뚜렷한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통 (2/5), 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 163/106 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없다. 이명 (3/5), 난청 (1/5), 어지러움 (1/5)이 있다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 67kg
- 활력징후: BP 124/81 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.3°C

■ 요약

53세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 변비, 잦은 음주, 수면의 질 저하, 전신 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 67kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향이 있다. 주 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반한다. 감기 증상은 발열, 오한,

콧물은 없으며, 간헐적인 기침이 있다. 비염 증상은 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다. 요통은 강도 2/10으로 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주 빈번하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상 있음.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/81 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.3°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 38세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 85kg
- 활력징후: BP 149/93 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.2°C

■ 요약

38세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 당뇨병을 앓고 있음. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 스트레스, 냉기, 습한 환경에 의해 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 85kg, BMI는 35.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 스트레스, 찬바람/냉기, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 및 스트레칭 시 증상이

완화된다고 한다. 수족냉증을 호소하며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨병으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 규칙적이거나, 복만/복통을 호소하며 구역/구토가 있다. 부패취와 신물이 올라오며, 구고를 느낀다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호하며, 땀을 많이 흘리는 다한증이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나빠고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/93 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태이며, 두께는 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.5°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 관련된 증상들을 호소한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 과거 이상지질혈증 및 고혈압 병력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 감소하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 7일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 기능성 소화불량으로 복만, 복통 (2/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이

동반된다고 한다. 증상은 수면 부족, 과로, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 수면 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 정도이다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 깊게 자는 편이나 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 편이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색, 두꺼운 설태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 64kg
- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.6°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 64kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량으로 내원하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다고 한다. 환자는 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 통증강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 나쁘다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 68kg
- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.3°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 현장직에 종사하며, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 매일 음주를 하는 편이다. 녹색 변과 잦은 대변 횟수를 보이며, 수면의 질이 좋지 않고, 전신 다한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명 및 난청, 어지러움 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 68kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 과거력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

직업은 현장직이며, 매일 음주를 하고 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.3℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 91kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 91kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 통증 강도는 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압, 당뇨 환자가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조 및 각질, 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 드는 편이며, 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태의 형태를 보인다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 33세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 100/64 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.6°C

■ 요약

33세 여성 환자로 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며, 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어진다고 함. 당뇨병 과거력 있으며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 습한 환경에서 악화되고 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 소화불량 증상으로 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨병으로 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이거나, 식욕 부진을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고 중도각성은 없다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 차가운 것보다 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/64 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다. 사지무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 89kg
- 활력징후: BP 131/86 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.9°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 발현되었으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 89kg, BMI는 31.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 불규칙한 식사 후 증상이 발현되었으며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한(多汗) 증상을 보인다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/86 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박(薄)하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 부허맥(浮虛脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 61kg
- 활력징후: BP 144/91 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.4°C

■ 요약

42세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기저질환을 가지고 있으며, 야식 후 속쓰림이 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 61kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다. 특히 야식을 먹은 후 증상이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭과 온열 자극 시 일시적인 완화를 경험한다. 수족냉증 증상 또한 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨로 진단받아 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 불편감을 느낀다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 하루 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애 (1/5)가 있고, 중도각성은 없다(0/5). 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/91 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 83kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 105/분, 체온 37.2°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 회식 후 과음과 과식 이후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 83kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 과식 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 낮은 편이다. 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회 소변을 보고 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며 어지러움을 느낀다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 51kg
- 활력징후: BP 111/73 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.1°C

■ 요약

40세 여성, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 악화, 수족냉증, 잦은 녹색변, 피로감, 기억력 저하 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 51kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 환자는 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 수면 부족, 습한

환경에 노출될 때 악화되며, 휴식을 취하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 구역감을 느낌.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/73 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.1℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없으나, 피부 건조도는 정상이고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증은 1/5 정도이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크고 팽대한 설질
- 설태: 황색의 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 30kg
- 활력징후: BP 140/93 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.3°C

■ 요약

10세 남환, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 변비, 수족냉증, 잦은 피로감을 호소하며, 활맥, 황니태 등의 소견 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 30kg, BMI는 14.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 복만감, 복통, 잦은 트림, 신물 올라옴, 구역감 등이 있다. 특히 식사 후 증상이 심해지는 경향을 보이며, 차가운 음식을 섭취하거나 습한

환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 환자는 수족냉증을 동반하며, 찬 음료보다는 따뜻한 음료를 선호한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/93 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.3℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 경미하게 있다(1/5). 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기는 크고, 태가 많다.
- 설태: 황색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 93kg
- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.2°C

■ 요약

39세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 증상 호소, 과음/과식 후 악화, 수족냉증, 어지러움 동반

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 93kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스 및 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다. 휴식 시 증상이 완화된다고 한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회, 규칙적으로 하며, 소화는 잘 안되는 편이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 특히 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.2°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있는 상태이다. 면색은 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 약간 크다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 68kg
- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.6°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 하지 부종 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 68kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

1년 전부터 기능성 소화불량 증상이 발생하여 현재까지 증상이 지속되고 있으며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 환자는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 감기 증상은 발열 및

오한이 없고, 콧물은 없으나 지속적인 기침을 호소한다. 비염 증상은 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10으로 미미하다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피로 미미한 수준이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (2/5), 구역감, 신물, 부패취, 구고 호소
- 대변: 변비, 흑색, 굳은 변
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간뇨 없음
- 수면: 7시간, 수면의 질 저하, 입면장애 (1/5), 중도각성 (5/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증
- 땀: 두부 다한, 땀 흘린 후 열감
- 통증: 요통 (2/10)
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.6°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 들, 사지 무력감, 피부 건조 정상, 가려움증, 이명 (0/5), 난청 (1/5), 어지러움 (0/5)
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 51kg
- 활력징후: BP 101/77 mmHg, 맥박 57/분, 체온 37.6°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 수족냉증, 다한 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 193cm, 체중은 51kg, BMI는 13.7이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 속쓰림, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 찬바람이나 냉기에 노출될 때, 수면 부족 시 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 몸을 덥히면 완화되는 경향을 보인다. 최근 증상이

악화되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피로 거의 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지 무력감을 느낀다. 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/77 mmHg, 맥박 57회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/74 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.8°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌으며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 가족력으로는 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 166cm, 체중은 64kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 장기간 진통제 복용 후

속쓰림이 심해졌으며, 스트레스와 찬바람/냉기에 증상이 악화되고 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/74 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.8℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 썩소하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 134/84 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.6°C

■ 요약

59세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화됨. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 증상이

완화되나, 무거운 짐을 들거나 흡연 시 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 폐경(Menopause) 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 구역감이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 녹색 변을 보고, 상태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/84 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 71kg
- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

■ 요약

56세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 증상 호소, 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 변비 및 흑색변, 피로감, 하지 부종, 어지럼증 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 71kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 섭취 후 소화불량 증상이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 양상을 보인다. 특히 기름진 음식 섭취나 수면 부족 시 증상이 심해지며, 따뜻하게 하거나 스트레칭을 할 경우 일시적으로

완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 특히 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 켜다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 74kg
- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.4°C

■ 요약

20세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 74kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 무거운 짐을 들거나 기름진 음식을 섭취할 경우 악화되고 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을

동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통이 있다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 나며, 발한 후 열감을 느낀다. 무한이다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 두껍게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 76kg
- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.1°C

■ 요약

20세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 시험/면접을 앞두고 3일 전부터 식욕부진이 심화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 76kg, BMI는 29.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험 및 면접에 대한 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력 및 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 56kg
- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.5°C

■ 요약

42세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 및 속쓰림 호소, 장기간 진통제 복용 후 증상 발현

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 56kg, BMI는 16.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 특히 무거운 짐을 들거나 수면이 부족할 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 최근 소화불량 증상과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고

있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 중풍 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 (4회/일), 소화불량, 구역감 호소
- 대변: 1회/일, 황색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (3/5), 중도각성 (True/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증 호소
- 땀: 보통, 두부에서 땀이 나며, 땀 흘린 후 열감 느낌
- 통증: 요통 (통증강도 1/10, 특이 양상 없음), 복만/복통 (1/5)
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 낮음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종 관찰, 피부 건조 및 각질, 가려움 호소, 이명 강도 2/5, 난청 5/5, 어지러움 2/5, 사지무력감 없음
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 84kg
- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.7°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 회식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 84kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식 섭취, 흡연, 스트레스에 의해 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취,

신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

과거 음주 이력은 없으나, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로 나며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.7°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며 어지러움을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 71세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 58kg
- 활력징후: BP 147/90 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.8°C

■ 요약

71세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 6개월 이상-1년 이내부터 복부 불편감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 58kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 과로 및 흡연 시 증상이 악화되며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 음료를 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/90 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 76kg
- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.7°C

■ 요약

43세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 평소 이상지질혈증과 고혈압을 앓고 있으며, 15개피/일 흡연, 불규칙한 식습관, 잦은 음주 습관이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 76kg, BMI는 29.3이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주요 증상으로는 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 음주 시 악화되고 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 비음주자이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 두부에서 땀이 나는 경향이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 47kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험을 앞두고 식욕부진과 소화기 증상이 악화되어 내원함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 47kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 지속되었으며, 시험 기간 동안 증상이 더욱 심해지는 경향을 보임. 최근 6일간은 식욕부진이 두드러지며, 복만감과 복통을 호소함. 안정 시에는 증상이 다소 완화되는 양상을 보임.

【과거력】

특이 과거력은 없음. 약물 복용력은 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 나타남. 부패취와 신물이 올라오며, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도가 있으며 각질이 보인다. 부종은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 크고 두텁다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 71kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.1°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 71kg, BMI는 30.3이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 습한 환경, 스트레스, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며 휴식 시 완화된다. 주소증으로는 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느끼고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소한다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 69kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.5°C

■ 요약

81세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 69kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 과로 시 증상이 악화되며, 온찜질이나 스트레칭 시 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 배뇨하며, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.5°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 115/분, 체온 36.5°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발현. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 수면 부족과 과로, 흡연이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (1/5)을 동반한다. 주관적인 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 수면 부족, 과로, 흡연 시 증상이

악화되며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 115회/분, 체온 36.5℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 63kg
- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.9°C

■ 요약

63세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 수면장애, 사지무력감, 난청, 암색 면색 등을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 63kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 기름진 음식 섭취, 습한 환경 노출, 과로

등이 있으며, 휴식 시 증상 완화를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다. 사지무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 58kg
- 활력징후: BP 123/87 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.1°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 야식을 먹고 바로 누운 후 속쓰림이 시작되었으며, 습한 환경과 흡연이 증상을 악화시킨다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 58kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 구역, 신물 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 습한 환경에 노출되거나 흡연 시

악화되는 경향을 보인다. 최근 증상이 호전되고 있다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일, 운동강도는 중강도로 규칙적인 운동을 하고 있다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 불편감을 느낌, 오심/구토 증상 있음
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낌, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5
- 한열: 오한/추위를 타며, 수족냉증이 있고, 음료는 온수를 선호함
- 땀: 보통, 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낌
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소, 스트레스 대처는 좋다고 진술

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/87 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질과 가려움증을 동반, 사지 무력감을 호소, 면색은 암색임

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 40kg
- 활력징후: BP 120/81 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 남환, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량 주소로 내원. 시험을 앞두고 긴장하며 식욕부진, 흑색변, 잦은 배변, 수족냉증, 다한, 창백한 안색 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 40kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 5일 전부터 중요한 시험을 앞두고 긴장하며 식욕 부진이 시작되었다. 이후 복만감과 함께 흑색의 묽은 변을 하루 2-3회 보며, 수족냉증, 구역감, 신물 오름, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다. 습한 환경과 흡연 시 증상이

악화되며, 안정 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 과거 특별한 병력은 없다.

【과거력】

특이 과거력 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/81 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 함께 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 35kg
- 활력징후: BP 178/105 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.7°C

■ 요약

10세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 고혈압, 잦은 소변, 수면장애, 다한, 오한, 사지무력감, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 35kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 야식 후 바로 눕는 습관이 있으며, 누우면 속쓰림이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이

나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일로 미미한 흡연을 한다. 운동 강도는 낮으며, 주로 앉아서 생활하는 시간이 길다. 수면 부족을 겪고 있으며, 흡연, 수면부족, 장시간 앉아있는 자세가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 스트레칭과 따뜻하게 하는 것이 증상 완화에 도움이 된다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기의 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 5회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 수면의 질이 낮고, 잠들기 어렵고(입면장애 5/5), 자다가 자주 깬다(중도각성 5/5). 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 178/105 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 황태 및 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 81kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.3°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 회식 후 소화불량 증상 발현, 변비, 혈뇨, 어지럼, 오한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 81kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일, 규칙성은 Menopause, 기간 0일, 생리통 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이며, 불규칙하다. 소화는 불량하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 2회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조한 편이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 47kg
- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.0°C

■ 요약

14세 남학생, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작, 변비, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 이명, 어지럼, 사지무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 47kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있다. 수면 부족 시 증상 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 141cm / 34kg
- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.7°C

■ 요약

11세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음/과식 이후 증상 악화. 변비, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 이명, 난청, 황색 면색 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 34kg, BMI는 17.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음/과식 이후 소화불량 증상이 발현되어 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화되며,식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통, 수족냉증, 구역,

구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 최근에는 사지무력감, 이명, 난청, 다한, 야간 도한 등의 증상도 동반되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리고, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 호소한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.

- 설태: 회태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 79kg
- 활력징후: BP 151/95 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.9°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 6개월 이상-1년 이내에 증상이 발현, 현재 호전 중. 불규칙한 식사 후 증상 발생. 습한 환경, 무거운 짐, 음주 시 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 79kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경, 무거운 짐, 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 34일로 불규칙하며, 기간은 5일, 생리통은 3/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/95 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.9°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 56kg
- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.1°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 고혈압 가족력. 잦은 녹색변, 불규칙한 식사, 수면 질 저하, 무한증, 하지 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명 및 난청, 어지러움, 암색의 면색, 회색의 후태, 삼맥과 현긴맥이 확인됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 56kg, BMI는 17.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 악화 중이다. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이

심화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경과 무거운 짐을 드는 것이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 입면장애는 없으나 중도각성이 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 무한증을 호소하며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 땀: 무한 (無汗), 두부에서 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.1℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/79 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.1°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 시작된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 증상이 완화되는 경향이 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이

있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력 감퇴를 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/79 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 80kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.7°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 80kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다. 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 소화불량 증상으로는 구역감, 신물, 부패취, 구고 등이 있다. 과로, 찬바람, 장시간 앉아있는 자세가 악화 요인이며, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이거나 소화가 잘 안 되며, 구역감이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼나 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 썩소하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 62kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.9°C

■ 요약

85세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화. 과거력에 이상지질혈증, 흑색변, 수족냉증, 무력감, 잦은 트림 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 62kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 악화 중이며, 음주 및 습한 환경에서 악화되고 안정 및 따뜻하게 하면 완화된다.

환자는 과거 이상지질혈증 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

과거 흡연력이 있으며, 현재는 하루 0.0개피를 흡연한다. 음주는 하지 않으며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사, 소화불량, 오심/구토 경향이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5), 기상 시 피로감.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 땀이 나는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다. 평소 땀은 거의 나지 않는다.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력 저하, 기억력은 좋음, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 잘 생김, 사지 무력감 호소, 피부 건조 및 각질 동반, 가려움은 없음
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/82 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.2°C

■ 요약

41세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨병력 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 악화 요인임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만 및 복통 (3/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 습관과 수면

부족 시 증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통 (3/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/82 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.2°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움 (4/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 53kg
- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 남학생, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량, 스트레스 후 악화, 변비, 다한, 잦은 소변, 수면 불량, 사지무력감, 피부 건조, 이명, 건망 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 53kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스 과다로 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 대변은 녹색의 굳은 변을

보며 변비 증세가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 긴 편이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 경미한 정도(1/5)이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태이며, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 75kg
- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.3°C

■ 요약

77세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 발현, 저체온, 잦은 기침, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 75kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 주소로 내원하였으며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 감기 증상으로는 저체온(35도 이하)과 잦은 기침이 있으며,

비염 증상은 없다. 요통은 경미한 수준(1/10)이다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 폐경。

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 True/5
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이거나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 (多汗) 증상이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.3℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 75kg
- 활력징후: BP 176/104 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

■ 요약

29세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량, 이상지질혈증을 호소하며, 고혈압 증상과 혈뇨를 동반하여 내원함

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 75kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림이 시작되었으며, 이후 복만, 복통, 신물 등의 소화불량 증상이 지속적으로 나타났다. 특히 기름진 음식 섭취 및 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보였다. 최근 고혈압 증상이 나타났으며, 소변에서 혈뇨가 확인되었다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고, 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 176/104 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 38kg
- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.2°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성소화불량 증상 호소. 회식 후 증상 시작, 과로 및 흡연 시 악화, 스트레칭 시 완화. 변비, 야간뇨, 얇은 수면, 도한, 무력감, 피부 가려움, 어지러움, 창백한 안색, 침맥, 세맥, 황니태 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 38kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있으며, 과로 및 흡연 시 악화되고 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 3/10이며, 통증 양상은 특별히 나타나지 않는다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 들고 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태 및 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 82kg
- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.4°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었으며, 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 82kg, BMI는 37.4이다.

【주소증】

6개월 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통이 있으며, 구역, 신물, 구고 증상을 동반한다. 증상은 오르내림을 반복하며, 장시간 앉아있거나 스트레스, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀小(소)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 83kg
- 활력징후: BP 102/64 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 흑색변, 잦은 배변, 전신 무한, 열감, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 166cm, 체중은 83kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스 상황에서 악화되는 경향을 보인다. 식이 조절 시 증상 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 0개피/일로 흡연하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 5회 중 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지 무력감을 느낀다. 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/64 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 63kg
- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 당뇨를 가지고 있으며, 야식 후 속쓰림이 악화됨. 수족냉증, 전신 부종, 창백한 안색을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 63kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 구역, 신물 등의 소화불량 증상을 호소한다. 특히 야식 후 증상이 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증을 동반한다. 최근 증상이 호전되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회로 불규칙하며, 구역, 구고, 신물, 부패취 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움을 느낌. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 무한이며 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피로감을 호소한다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기.
- 설태: 황태, 니태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 91kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.9°C

■ 요약

63세 남성, 기능성 소화불량, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림, 수족냉증, 복만, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 91kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 찬바람이나 습한 환경에서 악화되고 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되는 느낌이 있다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다. 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.9°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 76kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.5°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 76kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.5°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 67kg
- 활력징후: BP 109/70 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.4°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 시험/면접 스트레스로 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 148cm, 체중은 67kg, BMI는 30.6이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 6일 전부터 시험/면접 스트레스로 인해 식욕 부진이 심화되었다고 한다. 복만/복통을 4/5 강도로 느끼며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경(Menopause) 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심 및 구토 증상 호소.
- 대변: 변비, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면은 깊으나 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗) 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/70 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상 면색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 58kg
- 활력징후: BP 129/87 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.4°C

■ 요약

60세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 58kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 식이 조절과 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/87 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.4℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 83kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.8°C

■ 요약

50세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화. 수족냉증, 어지러움, 변비, 잦은 소변, 피로감, 무기력, 하지 부종, 잦은 멍, 오한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 177cm, 체중은 83kg, BMI는 26.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 호전 중이다. 주된 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 특히 매운 음식을 섭취하면 증상이 악화되는 경향을

보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 74kg
- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 속쓰림, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 앓고 있으며, 장시간 앉아있는 습관, 기름진 음식 섭취, 흡연 등이 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 181cm, 체중은 74kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있다. 증상은 점차 악화되는

추세이며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 습관, 기름진 음식 섭취, 흡연 등이 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 수면 및 온찜질 시 증상이 다소 완화된다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5)를 호소한다. 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에도 상쾌함을 느끼지 못한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상을 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하며, 크기가 크고 태가 많다.
- 설태: 황태와 니태가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 50kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 50kg, BMI는 17.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 스트레스와 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며,식이 조절 및 온찜질 시 증상이

완화되는 경향을 보인다. 현재 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이나 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 무한이며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고 멍이 잘 들며 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 삼맥이며, 복합맥상은 현긴맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 58kg
- 활력징후: BP 148/96 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.9°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 7일간의 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 변비, 혈뇨, 얇은 수면, 야간 도한, 이명, 어지럼증, 창백한 면색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 58kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량을 호소하며, 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(5/5)가 있다. 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/96 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 55kg
- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.0°C

■ 요약

57세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 55kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 구역감 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스, 과로, 음주 시 악화되는 경향을 보인다. 특히 야식을 섭취 후 바로 눕는 경우 증상이 심해진다고 한다. 환자는 수족냉증, 신물, 부패취, 구고 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. 과거 수술력은 없다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 좋지 않으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 몸이 무겁다고 한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나는 편이며, 발한 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움을 3/5 정도 느낀다고 한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/67 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.9°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관과 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 변비와 혈뇨를 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로, 사무직에 종사한다. 신장은 159cm, 체중은 62kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며, 식습관 불규칙 시 악화되는 경향을 보인다. 소화불량 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 감기, 비염,

요통 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 구역감을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회 소변을 보고 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1회 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/67 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부 건조도는 정상이다. 사지 무력감은 호소하지 않으며, 명은 정상이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 있으며, 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 141cm / 50kg
- 활력징후: BP 135/80 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.1°C

■ 요약

12세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력 상 당뇨 가족력이 있으며, 기름진 음식 과식 후 속이 불편해지는 증상과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 50kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 기름진 음식 섭취 및 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증,

구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴 맛을 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀을 많이 흘리며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/80 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움을 호소한다. 사지 무력감이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 49kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.5°C

■ 요약

13세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량 호소. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 발생. 변비, 잦은 땀, 사지무력감, 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 49kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 지속되었으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 특히 매운 음식을 섭취하면 증상이 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량 지속, 오심이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색 변을 보고, 보통 정도의 양이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없으나, 땀을 많이 흘리고 (특히 두부), 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 49kg
- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.2°C

■ 요약

43세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발생, 수족냉증, 구역감, 잦은 트림, 신물, 쓴맛 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 49kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 식사 후 복만감과 복통(3/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 온찜질과 휴식을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 27일로 규칙적이나, 현재 생리 기간은 아니다. 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량, 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 성상은 굳다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하된 상태이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 66kg
- 활력징후: BP 111/68 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 66kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 찬바람에 노출될 시 악화되고 안정을 취할 시 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 중강도의 운동을 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/68 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 사지 무력감을 호소하며 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 58kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 과거력 상 가족력으로 고혈압 및 중풍이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 58kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식을 과식한 후 악화되는 경향을 보인다. 습한 환경이나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 온찜질

시에는 다소 완화되는 느낌을 받는다. 복만/복통은 3/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 횟수 (4회/일), 소화불량 호소, 구역/구토 증상 동반.
- 대변: 변비, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도 각성이 있다 (True/5).
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 목이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 크다 (대/태).
- 설태: 백태, 얇게 덮여있다 (박태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 131cm / 36kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.6°C

■ 요약

10세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 속쓰림, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 131cm, 체중은 36kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 속쓰림 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 속쓰림과 소화불량을 호소한다. 증상은 야식 후 바로 누웠을 때 시작되었으며, 전반적으로 증상이 비슷하게 유지되거나 때때로 오르내림이 있다고 한다. 기름진 음식 섭취, 스트레스, 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감과 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변 또는 연변을 보며, 황색이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망한 편이며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설체가 작다.
- 설태: 황태 및 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 87kg
- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.0°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원. 과거 심한 업무 스트레스 후 소화불량 시작. 오한, 어지러움, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 87kg, BMI는 36.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하였다. 5일간의 심한 업무 스트레스 이후 증상이 발현되었으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 호전되는 경과를 보이고 있다. 악화

요인으로는 수면 부족이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 약간의 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 61kg
- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.2°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 61kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 증상이 악화되었다. 수족냉증을 동반하며, 식사 후 부패취가 느껴지는 트림을 한다. 습한 환경과 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5)가 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5이며, 난청은 1/5 정도로 경미하다. 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 79kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.7°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 심화, 수족냉증, 잦은 설사, 혈뇨, 얇은 수면, 무한, 전신 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 79kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 느껴왔으며, 특히 매운 음식을 섭취하거나 습한 환경에 노출될 경우, 또는 장시간 앉아있을 때 증상이 악화된다고 호소한다. 최근에는 증상이 다소 호전되는 경향을 보이나, 여전히 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 두부에만 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설/태설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 79세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 74kg
- 활력징후: BP 138/81 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.1°C

■ 요약

79세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 혈압약 복용 중. 변비, 다한, 어지러움, 사지무력감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 162cm, 체중은 74kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 불규칙한 식사 시 악화되는 경향을 보인다. 안정 및식이 조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 중등도이다. 폐경 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(2/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애 (1/5), 중도 각성 (5회/밤)을 호소한다.
- 한열: 열감을 잘 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 어지러움(5/5)을 호소하며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/81 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 절로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 薄하게 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 72kg
- 활력징후: BP 128/88 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.5°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 관련 약물을 복용 중임. 야식을 먹고 바로 누운 후 속쓰림이 시작되었고, 흑색변 및 전신 부종, 잦은 가려움, 사지무력감, 어지러움, 이명, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 72kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 야식 후 악화되는 경향을 보이며,

특히 기름진 음식 섭취 후 더욱 심해지는 느낌이라고 한다. 또한, 스트레스가 심할 때 증상이 악화되며, 수면 후에는 다소 완화되는 경향이 있다. 최근에는 소화불량과 함께 전신 부종, 잦은 가려움, 사지무력감, 어지러움, 이명, 난청 등의 증상이 동반되고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 중단하였다. 운동은 중등도로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얇으며, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌한 느낌이 든다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/88 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.5℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다. 사지무력감을 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 48kg
- 활력징후: BP 121/82 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.3°C

■ 요약

77세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 심장병의 병력 및 가족력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 48kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 주된 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 과거 흡연력이 있으나 현재는 금연 중이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 5회 소변을 보며, 황색뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/82 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 58kg
- 활력징후: BP 118/62 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.6°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 오한, 소화불량, 피로감 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 181cm, 체중은 58kg, BMI는 17.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 찬바람에 노출될 시 증상이 악화되며,식이 조절 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제를 복용했다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토 증상이 있으며, 부패취와 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦)를 느끼기도 한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하게 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/62 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 57kg
- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.9°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발병한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작. 스트레스, 장시간 앉기, 음주 시 악화. 잦은 식사, 적은 음수량, 녹색변, 다한, 무력감, 이명, 난청, 황색 면색 등의 소견.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 57kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 회식 후 과음, 과식 이후 증상이 시작되었으며, 스트레스, 장시간 앉기, 음주 시 증상이 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5).
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10).
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.9°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5.
- 면색: 황색.

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/91 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.7°C

■ 요약

29세 여성, 기능성 소화불량으로 내원. 회식 후 발생한 소화불량, 변비, 수족냉증, 다한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 78kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 전 회식 이후 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 환자는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 무거운 짐을 들거나 흡연, 수면 부족 시 증상이 악화되며, 온찜질이나 충분한 수면 시 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 29일로 규칙적이며, 기간은 5일, 생리통은 6/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/91 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없고, 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥