

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 51kg
- 활력징후: BP 101/77 mmHg, 맥박 57/분, 체온 37.6°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 수족냉증, 다한 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 193cm, 체중은 51kg, BMI는 13.7이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 속쓰림, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 찬바람이나 냉기에 노출될 때, 수면 부족 시 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 몸을 덥히면 완화되는 경향을 보인다. 최근 증상이

악화되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피로 거의 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지 무력감을 느낀다. 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/77 mmHg, 맥박 57회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥