

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/74 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.8°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌으며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 가족력으로는 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 166cm, 체중은 64kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 장기간 진통제 복용 후

속쓰림이 심해졌으며, 스트레스와 찬바람/냉기에 증상이 악화되고 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/74 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고舌小하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥