

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 71kg
- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

■ 요약

56세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 증상 호소, 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 변비 및 흑색변, 피로감, 하지 부종, 어지럼증 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 71kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 섭취 후 소화불량 증상이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 양상을 보인다. 특히 기름진 음식 섭취나 수면 부족 시 증상이 심해지며, 따뜻하게 하거나 스트레칭을 할 경우 일시적으로

완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 특히 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 켜다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약