

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 76kg
- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.7°C

■ 요약

43세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 평소 이상지질혈증과 고혈압을 앓고 있으며, 15개피/일 흡연, 불규칙한 식습관, 잦은 음주 습관이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 76kg, BMI는 29.3이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주요 증상으로는 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 음주 시 악화되고 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 비음주자이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 두부에서 땀이 나는 경향이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색