

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 71kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.1°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 71kg, BMI는 30.3이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 습한 환경, 스트레스, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며 휴식 시 완화된다. 주소증으로는 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느끼고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소한다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부허