

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 63kg
- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.9°C

■ 요약

63세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 수면장애, 사지무력감, 난청, 암색 면색 등을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 63kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 기름진 음식 섭취, 습한 환경 노출, 과로

등이 있으며, 휴식 시 증상 완화를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다. 사지무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥이다.