

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 35kg
- 활력징후: BP 178/105 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.7°C

■ 요약

10세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 고혈압, 잦은 소변, 수면장애, 다한, 오한, 사지무력감, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 35kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 야식 후 바로 눕는 습관이 있으며, 누우면 속쓰림이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이

나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일로 미미한 흡연을 한다. 운동 강도는 낮으며, 주로 앉아서 생활하는 시간이 길다. 수면 부족을 겪고 있으며, 흡연, 수면부족, 장시간 앉아있는 자세가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 스트레칭과 따뜻하게 하는 것이 증상 완화에 도움이 된다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기의 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 5회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 수면의 질이 낮고, 잠들기 어렵고(입면장애 5/5), 자다가 자주 깬다(중도각성 5/5). 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 178/105 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 황태 및 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥