

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/79 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.1°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 시작된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 증상이 완화되는 경향이 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이

있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력 감퇴를 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/79 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥