

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 80kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.7°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 80kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다. 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 소화불량 증상으로는 구역감, 신물, 부패취, 구고 등이 있다. 과로, 찬바람, 장시간 앉아있는 자세가 악화 요인이며, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이거나 소화가 잘 안 되며, 구역감이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼나 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 썩소하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실