

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 64kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 119/분, 체온 37.9°C

■ 요약

43세 남성, 6개월 이상-1년 이내 속쓰림을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 64kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 속쓰림, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 확인되지 않았다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 37.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감은 없으며, 피부는 각질이 있고 건조하나 가렵지는 않다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴