

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 65kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.0°C

■ 요약

76세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상과 장기간 진통제 복용 후 속쓰림을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 65kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 습한 환경, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 안정 시에는 증상이 완화된다. 최근 4일간 속쓰림이 심해졌다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 장기간 진통제를 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.0°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥