

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.6°C

■ 요약

33세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증 과거력 및 수면 부족, 음주가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취 후 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 수면 부족과 음주가 증상 악화 요인으로 작용한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 비교적 길지만, 깊은 수면을 취하며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이고, 피부는 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 세약맥이다.