

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 60kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 112/분, 체온 36.8°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었고, 이상지질혈증, 심장병 및 중풍 가족력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 60kg, BMI는 18.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세임. 주 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 스트레칭 및 수면 시 증상 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량 지속, 오심 및 구토 증상 간헐적으로 나타남
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 2회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 호소. 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐, 열수를 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 보통 정도의 발한, 주로 두부에서 발생, 땀 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 강도 1/10, 양상은 다양하지 않음
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소. 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편, 피부 건조도는 정상
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 無力

- 맥상: 緩脈