

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 34kg
- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 남환, 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량으로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 흑색변, 잦은 배변, 수족냉증, 피로감을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 34kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세가 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만 및 복통을 호소하며, 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 경향이 있다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 및 난청은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약