

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/78 mmHg, 맥박 56/분, 체온 37.6°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작, 이상지질혈증 약물 복용 중. 잦은 음주와 흡연, 스트레스에 취약한 상태.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 70kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이며, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주와 15개피/일 흡연을 하며, 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량과 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/78 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 완맥