

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 69kg
- 활력징후: BP 130/82 mmHg, 맥박 74/분, 체온 38.1°C

■ 요약

73세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 69kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 음주와 스트레스에 의해 악화되고 스트레칭 및 온열에 의해 완화된다. 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 현병력이 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비, 녹색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 12회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/82 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 38.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대