

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 133cm / 34kg
- 활력징후: BP 154/94 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작됨. 고혈압 가족력이 있으며, 오한, 수족냉증, 잦은 녹색변, 혈뇨, 창백한 면색, 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 133cm, 체중은 34kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 기억력이 나쁘며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/94 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥