

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.0°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증을 앓고 있음. 평소 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 장시간 앉아있는 경우와 수면이 부족할 때 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 현재 이상지질혈증으로

약물 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 주로 앉아서 근무하는 사무직에 종사한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 9회 정도 주간에 보고, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 5번 중 자주 있는 편이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 가끔 두부에 땀이 나지만, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소하나, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 멍이 잘 드는 편이며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 크고 부어있다.
- 설태: 황태와 니태가 끼어있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대