

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 50kg
- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.2°C

■ 요약

14세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 변비, 흑색변, 다한, 오한, 피로감, 소화불량 등의 증상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 50kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 식이조절 시 증상 완화가 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 확인되지 않았다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관, 복만/복통 (3/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 보통의 양상을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며, 어지러움을 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실