

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 58kg
- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.6°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 발생했으며, 습한 환경, 음주, 수면 부족 시 악화되고 안정과 휴식 시 완화된다. 수족냉증을 호소하며, 설진상 홍설, 황니태, 맥진상 부맥, 홍맥, 활맥이 확인된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 58kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 증상은 비슷하게 유지되거나

오르내림이 있으며, 습한 환경, 음주, 수면 부족 시 악화되고 안정 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 소화불량 증상으로는 복만/복통 (3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10으로 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥