

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 134cm / 33kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.0°C

■ 요약

10세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 야식 후 속쓰림으로 시작됨. 평소 기름진 음식 섭취와 과로가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 수족냉증, 잦은 녹색변, 옅은 수면, 무력감, 피부건조 및 가려움, 창백한 안색 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여 환자로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 33kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환아는 6개월 전부터 간헐적인 속쓰림을 호소하였으며, 최근 증상이 악화되어 내원하였다. 환아는 식사 후 복부

팽만감과 함께 구역, 신물 오름, 잦은 트림을 호소한다. 특히 기름진 음식을 섭취하거나 과로를 한 경우 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 아울러 수족냉증, 잦은 녹색변, 열은 수면, 무력감, 피부건조 및 가려움, 창백한 안색 등을 동반하고 있다. 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)은 호소하지 않았다. 요통은 경미하게 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환아는 학생으로, 음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (4/5), 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 오한, 추위를 탐, 열수를 선호, 수족냉증 호소
- 땀: 보통, 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피로감 및 냉함을 느낌
- 통증: 요통 (4/10), 통증 양상은 다양하지 않음
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력은 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감, 안면 부종, 멍이 잘 드는 편, 피부 건조 및 가려움 호소
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥