

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 38세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 85kg
- 활력징후: BP 149/93 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.2°C

■ 요약

38세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 당뇨병을 앓고 있음. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 스트레스, 냉기, 습한 환경에 의해 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 85kg, BMI는 35.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였다. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 스트레스, 찬바람/냉기, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 및 스트레칭 시 증상이

완화된다고 한다. 수족냉증을 호소하며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨병으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 규칙적이거나, 복만/복통을 호소하며 구역/구토가 있다. 부패취와 신물이 올라오며, 구고를 느낀다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호하며, 땀을 많이 흘리는 다한증이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나빠고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/93 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태이며, 두께는 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥