

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 64kg
- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.6°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 64kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량으로 내원하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다고 한다. 환자는 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 통증강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 나쁘다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥