

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 91kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 91kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 통증 강도는 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압, 당뇨 환자가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조 및 각질, 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 드는 편이며, 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태의 형태를 보인다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥