

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 45kg
- 활력징후: BP 115/69 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

57세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 45kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 속쓰림, 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 악화 요인으로는 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위, 음주가 있으며, 스트레칭과 휴식을 통해 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 전신에 땀이 나지 않는다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/69 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고, 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 세약