

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/62 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.0°C

■ 요약

69세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 68kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량으로, 최근 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 안정 및 스트레칭 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으나, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높으나 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/62 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색의膩苔가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥, 虛大