

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

15세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었음. 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 무거운 짐을 들 때 악화되고 스트레칭이나 따뜻하게 하면 완화된다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (2/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 12시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감 호소, 입면장애(4/5), 중도각성(3/5)
- 한열: 보통, 수족냉증, 냉수 선호
- 땀: 다한, 전신 발한, 발한 후 피로감 및 냉감 호소
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망, 스트레스 대처 능력 보통, 의욕 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 사지 무력감 호소, 피부 건조도는 정상, 가려움 없음, 이명 강도 1/5, 난청 1/5, 어지러움 3/5
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 허대