

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:47

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 51kg
- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.1°C

## ■ 요약

13세 남학생으로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압 가족력이 있다. 흡연, 수면 부족, 과로 시 증상 악화, 수면 시 완화되는 경향을 보임. 저체온, 소화불량, 요통, 이명, 난청, 어지러움 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 51kg, BMI는 21.0이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 야식 후 발생한 속쓰림이 지속적으로 나타나며, 증상의 호전과 악화가 반복되는 양상을 보인다. 흡연, 수면

부족, 과로 시 증상이 악화되고, 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없고 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움을 5/5로 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 켜다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥