

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 76kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.4°C

■ 요약

18세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되었고, 과로 시 악화, 수면 및 안정 시 완화됨. 변비, 잦은 피로감, 더위 참, 수족냉증 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 76kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 지속적으로 나타났다 호전되기를 반복한다. 최근 진통제 복용 이후 속쓰림이 심해졌으며, 과로 시 증상이 악화되고 수면 및 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는

수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 면색은 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥