

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 66kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.9°C

■ 요약

42세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압, 당뇨병력이 있고, 흑색변, 수족냉증, 잦은 트림 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 174cm, 체중은 66kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 야식 후 속쓰림이 발생했으며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림을 반복한다. 음주 시 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통(4/5), 수족냉증,

구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨의 현병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.9℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이며 어지러움이 약간 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대