

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 55kg
- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.0°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식습관과 이상지질혈증 과거력 있음. 수족냉증, 무한, 변비, 피로감, 기억력 저하 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 55kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 오르내림이 있으며, 주로 식사 후 복만감, 복통, 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 특히 수족냉증이 심하며, 휴식을 취하면 다소 완화되나, 장시간 앉아 있을 경우 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이거나, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토, 신물, 구고, 부패취 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며(無汗), 야간에 식은땀을 흘리는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있으며, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥