

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 82kg
- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.2°C

■ 요약

52세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 82kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (3/5)을 동반한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 수면 부족 및 찬바람에 노출 시 악화되며, 수면 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/83 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 침긴