

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 52kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.4°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화됨. 평소 수족냉증과 잦은 피로감을 느낌.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 52kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량을 호소하며, 복만, 복통 (3/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 장기간 진통제 복용 이후 악화되었으며, 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 잦은 빈뇨 (주간 12회, 야간 1회), 적색/혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 얕은 잠을 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥