

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 59kg
- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 113/분, 체온 38.3°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 회식 후 과음과 과식으로 인해 증상이 시작됨. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 59kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 저체온을 보이며, 잦은 기침을 호소한다. 비염 증상은 호소하지 않는다. 요통은 경미하며, 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 회식 후 과음, 과식 후 발생했으며, 호전되는 경과를 보인다. 수면과 안정을 취할 때 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 38.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴