

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.0°C

■ 요약

49세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 과거력 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 불규칙한 식사가 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 통증 강도는 2/5 정도이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 과거력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 전신에 땀이 없으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.0°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미한 정도(1/5)이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭