

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 73kg
- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.0°C

■ 요약

53세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 73kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다고 한다. 환자는 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주 증상 외에 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연력은 25개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감/더위탐 경향이 있으며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 허대