

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 68kg
- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.3°C

■ 요약

69세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 68kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량 증상을 호소하며, 최근 속쓰림이 심해짐. 복만, 복통은 경미(1/5)하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일, 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량, 오심이 있음.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 잠, 기상 시 무거움, 입면장애(2/5), 중도각성(1/5).
- 한열: 보통, 온수를 선호, 수족냉증은 없음.
- 땀: 보통, 두부에 땀이 나며, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통은 강도 1/10.
- 정신/정서: 기억력 저하, 무기력, 스트레스 대처 능력 낮음.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.3°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 하지 부종 관찰, 피부 건조도는 정상이나 가려움 호소, 이명 강도 2/5, 난청 3/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 침긴