

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 37세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 60kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.6°C

■ 요약

37세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 흑색변, 다한, 오한 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 60kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 속쓰림, 구역감, 신물, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 휴식 및 식이 조절 시 완화되나, 음주 시 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증을 동반하며, 구고 증상도 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 무거운 느낌이 있다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥