

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 86kg
- 활력징후: BP 113/68 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.0°C

■ 요약

68세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 6개월 이상-1년 이내에 발병하였으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 86kg, BMI는 36.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 시작되었으며, 이후 증상이 점차 악화되는 양상이다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 기름진 음식 섭취 시

증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕은 보통이나 소화가 잘 안 되며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 10점 만점에 2점이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/68 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.0℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 5점 만점에 3점, 난청은 3점이다. 어지러움은 5점 만점에 3점이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥