

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 138cm / 38kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성 소화불량, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 악화. 흑색변, 잦은 소변, 야간 도한, 무기력, 어지럼증, 잦은 이명, 식사 불규칙, 냉수 선호.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 38kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다고 호소한다. 증상으로는 흑색변, 잦은 소변, 야간 도한, 무기력, 어지럼증, 잦은 이명 등이 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 장기간 진통제 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회로 빈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 5시간으로 수면 시간이 짧고, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대