

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 87kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.0°C

■ 요약

40세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생, 이상지질혈증 및 고혈압 병력, 흡연 습관, 습한 환경에서 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 87kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다. 특히 습한 환경과 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 다른 특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 다양하게 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥