

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 63kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.9°C

■ 요약

52세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 63kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다. 증상은 수면 부족과 과로 시 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 병력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 5회 발생한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀이 나면 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 자주 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭