

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 195cm / 67kg
- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.3°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 무거운 짐을 들거나 수면 부족 시 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 195cm, 체중은 67kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 환자는 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다고 진술하였다. 무거운 짐을 들거나 수면 부족 시

증상이 악화되며, 스트레칭이나 온찜질 시 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 저 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 낮에 12회, 밤에 2회 소변을 보며, 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도로 경미하다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴