

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 75kg
- 활력징후: BP 176/104 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

■ 요약

29세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량, 이상지질혈증을 호소하며, 고혈압 증상과 혈뇨를 동반하여 내원함

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 75kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림이 시작되었으며, 이후 복만, 복통, 신물 등의 소화불량 증상이 지속적으로 나타났다. 특히 기름진 음식 섭취 및 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보였다. 최근 고혈압 증상이 나타났으며, 소변에서 혈뇨가 확인되었다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고, 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 176/104 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥