

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 83kg
- 활력징후: BP 102/64 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 흑색변, 잦은 배변, 전신 무한, 열감, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 166cm, 체중은 83kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스 상황에서 악화되는 경향을 보인다. 식이 조절 시 증상 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 0개피/일로 흡연하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 5회 중 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지 무력감을 느낀다. 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/64 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥