

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 91kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.9°C

■ 요약

63세 남성, 기능성 소화불량, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림, 수족냉증, 복만, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 91kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 찬바람이나 습한 환경에서 악화되고 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되는 느낌이 있다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다. 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.9°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허