

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 58kg
- 활력징후: BP 129/87 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.4°C

■ 요약

60세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 58kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 식이 조절과 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/87 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.4℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색