

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 50kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 50kg, BMI는 17.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 스트레스와 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며,식이 조절 및 온찜질 시 증상이

완화되는 경향을 보인다. 현재 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이나 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 무한이며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고 멍이 잘 들며 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 삼맥이며, 복합맥상은 현긴맥이다.