

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 87kg
- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.0°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원. 과거 심한 업무 스트레스 후 소화불량 시작. 오한, 어지러움, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 87kg, BMI는 36.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하였다. 5일간의 심한 업무 스트레스 이후 증상이 발현되었으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 호전되는 경과를 보이고 있다. 악화

요인으로는 수면 부족이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 약간의 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥